

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
FACULTÉ DES SCIENCES



ANNUAIRE

de l'Institut de Physique du Globe

1928

Publié sous la direction de
E. ROTHÉ
Professeur à la Faculté des Sciences

DEUXIÈME PARTIE

SÉISMOLOGIE

OBSERVATIONS DES STATIONS FRANÇAISES

BULLETIN
DU
BUREAU CENTRAL SÉISMOLOGIQUE FRANÇAIS

MENDE
IMPRIMERIE G. PAUC
6, RUE D'AYGUES-PASSES, 6

1929



INTRODUCTION

Au cours de l'année 1928 le personnel de l'Institut de Physique du Globe, séismologie, est resté le même et chaque personne a rempli les mêmes fonctions. La publication de l'Annuaire est faite exactement sur le modèle des années précédentes.

Le tableau I contient par ordre de date et d'heure les observations des tremblements de terre, à Al. Alger, Be. Besançon, Ba. Bagnères de Bigorre, Gr. Grenoble, LM. Le Mans, Ma. Marseille, Pa. Paris, PD. Puy-de-Dôme, St. Strasbourg; tableau établi conformément aux conventions internationales par M^{lle} J. Roess, préparatrice au Laboratoire des Hautes-Etudes, également chargée de la rédaction du *Bulletin mensuel* provisoire du bureau central séismologique français.

Les colonnes successives contiennent les dates, phases, heures, périodes des trains d'onde M, amplitudes correspondantes, distances de l'épicentre calculées, remarques et particularités. Une dernière colonne contient l'indication de la région probable de l'épicentre, toutes les fois que la détermination a pu être faite par M. Rothé.

Dans la plupart des cas, les coordonnées géographiques ne sont pas déterminées avec précision; ce travail ferait double emploi avec celui que M. Turner veut bien exécuter au nom de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale.

Nous sommes heureux d'adresser nos remerciements aux diverses stations qui ont bien voulu nous faire parvenir les observations pour l'année 1928, (bulletins, cartes et renseignements), en outre des stations françaises et qui sont par ordre alphabétique :

Alicante	Florissant (Saint-Louis Univ.)	Padoue
Alipore	Fordham (New-York)	Panama (Balboa Heights)
Almeria	Georgetown Univ. (Wash.)	Perth
Ann Arbor	Graz	Prague
Apia (Samoa)	Halifax	Ravensbourg
Athènes	Hambourg	Rocca di Papa
Barcelone	Helsingfors	Rome (Office central)
Batavia	Helwan	Sainte-Anne
Belgrade	Hohenheim	Saint-Louis, Missouri
Bergen	Honolulu	San Fernando
Berkeley	Hukuoka	Saskatoon
Bogota	Innsbruck	Scoresby-Sund
Bombay	Carlsruhe	Sitka, Alaska
Budapest	Kew	Spokane
Buffalo	Kobe	Stonyhurst
Cambridge (Harvard)	Koenigsberg	Sucre
Carloforte	La Paz	Sumoto
Cartuja (Granada)	La Plata	Suva
Charlotteville	Lick	Sydney Gov. Observatory
Cheb	Lund	Sydney Riverview
Cheltenham, Maryland	Malaga	Taihoku (Formose)
Chicago (Loyola)	Manille	Tarente
Chicago (U. S. C. G. S.)	Marquette	Tolède
Cincinnati	Milwaukee	Toronto
Coïmbre	Melbourne	Tortosa (Ebro)
Copenhague	Nagasaki	Toyooka
De Bilt	Nagoya	Trenta (Cosenza)
Denton	New-Orléans	Trévisé
Denver, Colorado	Osaka	Tucson
Dyce (Aberdeen)	Ottawa	Uccle
Florence (Ximeniano)	Oxford	Valle di Pompei

Venise	Washington (U. S. C. G. S.)	Zagreb
Victoria	Wellington	Zi-Ka-Wei
Vienne	West-Bromwich	Zurich

Stations dont les données ont été transmises par le service séismologique suisse :
Neufchâtel, Coire, Budapest, Hambourg, Munich et Vienne.

Par l'aimable intermédiaire de M. Agamennone nous avons reçu en outre, des données sur les tremblements de terre italiens de :

Bari	Livourne	Plaisance
Bénévent	Mileto	Rome (Office central)
Casamari	Mineo	Sienna
Casamiciola	Messine	Teramo
Catane	Montecassino	Venise
Chiavari	Naples (Inst. vulc.)	

Un tableau II contient des renseignements sur l'agitation microséismique d'après les conventions également adoptées par l'Observatoire de Bruxelles : nous indiquons en microns l'amplitude des plus grandes ondes constatées dans l'intervalle de 15 minutes avant, 15 minutes après l'heure, aux heures 0, 6, 12, 18 sur les composantes NS et EW. Ce tableau a été établi d'après les inscriptions de l'appareil Galitzine.

Pour l'Observatoire du Parc Saint-Maur, on a reproduit le journal séismologique dressé par M. Eblé, suivant les conventions adoptées par cet établissement, à savoir :

0, calme : les séismogrammes sont une ligne droite, sur laquelle on a toléré tout au plus des oscillations peu nombreuses et d'amplitude à peine perceptible.

1, peu agité : ondulations continues de très faible amplitude ou ondulations un peu plus grandes mais moins persistantes.

2, agité : ondulations continues d'amplitude notable, présentant parfois des maxima plus accentués.

3, très agité : oscillations continues et grandes, dont l'amplitude atteint souvent 2^{mm} sur les tracés (amplification 150 environ).

La troisième partie a été consacrée aux tremblements de terre en France et aux Colonies. Elle a été rédigée par MM. Rothé, Lacoste, M^{me} Hée et M. Bois.

Le tableau IV qui suit et qui contient quelques renseignements macroséismiques a été rédigé par M. Bois.

M. Lacroux, successeur de M. Ginestous, alors chef du service météorologique tunisien, nous a communiqué une note sur les tremblements de terre ressentis en Tunisie au cours de l'année 1928.

De même, le R. P. Ch. Poisson, directeur de l'Observatoire de Tananarive, nous a fait parvenir une note relative aux tremblements de terre ressentis à Madagascar pendant cette même période.

D'autre part, l'Institut a échangé des télégrammes par fil avec divers observatoires, à l'occasion de tremblements de terre importants. Les échanges gratuits avec l'Espagne ont été particulièrement nombreux. Nous apprécions grandement les télégrammes qui nous sont aimablement envoyés par l'Observatoire de Zi-Ka-Wei par l'intermédiaire de M. le Consul de France à Chang-Hai et le Ministère des Affaires Etrangères à Paris, et ceux qui nous sont adressés de la station de Phu-Liên, par l'intermédiaire du Ministère des Colonies.

Les amplitudes des maximums ont été calculées à Paris d'après les appareils Wiechert, pour lesquels le grandissement est voisin de 200, à Strasbourg d'après les appareils Galitzine. Les autres stations indiquent les amplitudes d'après les appareils Mainka. Les valeurs des constantes des appareils sont conservées dans les divers observatoires et à la disposition des personnes qui pourraient en avoir besoin. Les valeurs moyennes sont d'ailleurs publiées dans le *Bulletin* provisoire envoyé mensuellement par les stations d'Alger, Paris et Strasbourg.

E. ROTHÉ.

DONNÉES RELATIVES AUX STATIONS FRANÇAISES DONT LES OBSERVATIONS
FIGURENT DANS CETTE PUBLICATION



STRASBOURG
(Jardin de l'Université)

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 7^{\circ} 45' 57'' \text{ E} \\ \varphi = 48^{\circ} 35' 05'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 135 m.
Sous-sol : gravier
Appareils : Wiechert $\left\{ \begin{array}{l} \text{horizontal} \quad 1000 \text{ k.} \\ \text{vertical} \quad 1200 \text{ k.} \end{array} \right.$
Séismographe horizontal 19 tonnes
Galitzine $\left\{ \begin{array}{l} \text{deux horizontaux} \\ \text{un vertical} \end{array} \right.$
Milne-Shaw : horizontal, N. S.

ALGER-BOUZARÉAH

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3^{\circ} 02' \text{ E} \\ \varphi = 36^{\circ} 48' 04'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 332 m.
Sous-sol : massif azoïque (schistes cristallins et calcaires métamorphiques).
Appareils : Bosch-Mainka $\left\{ \begin{array}{l} 400 \text{ kg.} \\ \text{deux composantes} \end{array} \right.$

PUY-DE-DOME

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 2^{\circ} 58' 01'' \text{ E} \\ \varphi = 45^{\circ} 46' 28'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 400 m.
Sous-sol : basaltes
Appareils : Bosch-Mainka $\left\{ \begin{array}{l} 130 \text{ k.} \\ \text{deux composantes} \end{array} \right.$

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 2^{\circ} 11' \text{ W de Paris} \\ \varphi = 43^{\circ} 04' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 560 m.
Sous-sol :
Appareils : S.O.M. $\left\{ \begin{array}{l} 450 \text{ k.} \\ \text{deux composantes} \end{array} \right.$

PARC-SAINT-MAUR
(près Paris)

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 2^{\circ} 29' 37'' \text{ E} \\ \varphi = 48^{\circ} 48' 34'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 47 m.
Sous-sol : calcaires du bassin de Paris
Appareils : Wiechert horizontal 1000 kg.
Mainka 400 kg.
deux composantes
Galitzine $\left\{ \begin{array}{l} \text{deux horizontaux} \\ \text{un vertical} \end{array} \right.$

BESANÇON

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 5^{\circ} 59' 15'' \text{ E} \\ \varphi = 47^{\circ} 14' 59'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 311 m.
Sous-sol : Bathonien moyen (calcaire compact).
Bathonien inférieur (calcaire plus ou moins marneux en bancs lités). Bajocien.
Appareils : Bosch-Mainka $\left\{ \begin{array}{l} 130 \text{ kg.} \\ \text{deux composantes} \end{array} \right.$

MARSEILLE

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 5^{\circ} 23' 38'' \text{ E} \\ \varphi = 43^{\circ} 18' 19'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 75 m.
Sous-sol : calcaire.
Appareils : Bosch-Mainka $\left\{ \begin{array}{l} 130 \text{ kg.} \\ \text{deux composantes} \end{array} \right.$

GRENOBLE

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 5^{\circ} 42' \text{ E} \\ \varphi = 45^{\circ} 11' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 244 m.
Sous-sol : rocher
Appareils : S.O.M. $\left\{ \begin{array}{l} 450 \text{ kg.} \\ \text{deux composantes} \end{array} \right.$

LE MANS

(station privée)

Coordonnées géographiques $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 0^{\circ} 12' 30,6'' \text{ E} \\ \varphi = 48^{\circ} 00' 17'' \text{ N} \end{array} \right.$
Altitude : 77 m.
Sous-sol : argile
Appareils : Mainka (type spécial) 300 kg.
deux composantes

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DONT LES STATIONS FRANÇAISES DÉPENDENT (personnel scientifique en 1928)

STRASBOURG

Institut de Physique du Globe de l'Université
de Strasbourg
Directeur : E. ROTHÉ
Chef de service : J. LACOSTE
Assistant : Ch. BOIS

ALGER-BOUZARÉAH

Observatoire de l'Université d'Alger
Directeur : F. GONNESSIAT
Station séismologique
Chef de service : F. GONNESSIAT

PUY-DE-DOME

Institut de Physique du Globe de l'Université
de Clermont-Ferrand
Directeur : E. MATHIAS
Chef du service séismologique : P. BÉNAC

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Institut de Physique du Globe de l'Université
de Toulouse
Directeur : DAUZÈRE
Chef de service : DORT

GRENOBLE

Station séismologique
Chef de service : M. SORREL

LE MANS

Station privée
Directeur : A. JAGOT
Chef de service : G. HUTREL

PARC SAINT-MAUR

Institut de Physique du Globe de l'Université
de Paris
Directeur : Ch. MAURAIN
Station séismologique : Observatoire du Parc
Saint-Maur
Chets de service : Ch. BRASIER et L. EBLÉ

BESANÇON

Observatoire de Besançon
Directeur : A. LEBEUF
Station séismologique
Chef de service : R. GOUDY

MARSEILLE

Observatoire de Marseille
Directeur : J. BOSLER
Station séismologique
Chef de service : J. CARRÈRE

Le bureau central séismologique français a été créé près de l'Institut de Physique du Globe
de Strasbourg (Décret du 28 juillet 1921) :

Directeur : E. ROTHÉ, professeur à la Faculté des Sciences.
Assistante : M^{lle} Y. DAMMANN.

Des stations fonctionnent aussi dans plusieurs colonies et protectorats :

Phu-Liên, près Haï-Phong (Indo-Chine),	Directeur : Lieutenant de vaisseau BRUZON.
Dakar (Afrique occidentale),	Directeur : WELTER.
Tananarive (Madagascar),	Directeur : R. P. Ch. POISSON.
Fort-de-France (Martinique),	Directeur : A. BOUTIN.
Tunis (Tunisie),	Directeur : G. GINESTOUS.
Ksara (République Libanaise),	Directeur : R. P. Ch. COMBIER.

1. Tremblements de terre inscrits

Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable
		h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_S μ			
Pa	eL F	0	42								Inscrit à Paris seulement.
St	R _{SS} F	3	14	46					(420)	Grand pendule.	Vénétie Feltre III, Bassano II-III Ressenti à Asolo, Monte- belluna et Possagno. Treviso i P 3h 12m 28s
St	e ₁ (P) e ₂ L F	9	38	42						V. Galitzine. " Galitzine.	Mexique Région Sud Province Oaxaca Tucson i P 9h 30m 17s 99°, 8 W et 14°, 3 N (en mer) d'après J. S. A.
Pa	eSE L M F	9	48	58	18-23	2	7				
St	i(P?) e ₁ (PR) e ₂ e ₃ L F	18	53	15						Dilatation V. Gal. Galitzine.	Données insuffisantes.
Pa	traces	19	03-18							Séismographe vertical.	
St	traces F	15	43	55						V. Galitzine.	
St	traces F	0	20	56						V. Galitzine. "	
Pa	eL F	0	26								
St	e(P') e L M F	21	46		20			+18		V. Galitzine. E. Galitzine.	Pacifique Manille e P 21h 31m 54s Sydney P 32 18 Perth e P 33 25
Al	e L M F	21	48	12	24	6	8				
Pa	eL M F	22	28		26	27	14	8			
St	traces F	14	36	53						V. Galitzine. "	
Al	iP S eL F	21	57	47					8360		Bolivie 23°S 67°, 5 W d'après La Paz et Sucre. La Paz 21h 47m 44s 700 km.
Al	P PR S L M M M F	19	40	28					5440		
			42	21							
			47	34							
			54		30	200	200				
			58		11	100	200				
		20	00	30							
			03	30	9	140					
		20	05	40	9		120				
		22	00								
PD	iP eS eL	19	40	53					6340	E. N. N. E.	Afrique orientale Anglaise Destructeur région du Mont Kenia. Ressenti près du lac Baringo
			48	47							
			55								
			57								
	M ₁ M ₂ F	20	05-06		11		39				Epicentre vers 0°, 5S, 36°, 5E
			10	01	11	+40					
			40								

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
6 Janvier (suite)	Gr	e eL M F	19 41 07 20 07 21 21			12	-34				N.	« Bulletin d'échanges »
	Ba	eP S eL M F	19 41 17 48 52 19 56 20 07 28 21 10			12	-48			5990	N. et E. N. N. et E.	
	Be	P S L M F	19 41 17 49 01 57 20 07-11 45									
	St	iPv m eS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ M ₉ M ₁₀ M ₁₁ M ₁₂ M ₁₃ M ₁₄ F	19 41 18 41 30 49 01 20 00 03 05 05 10 07 00 15 35 08 05 10 50 09 00 30 10 00 11 00 20 30 23 00			6 15 15 18 16 15 15 12 10 10 10 10 10 10 10 15			+23 +49 -28 +40 -52 +47 -52 +38 -37 -47 -41 +32 -65	6130	Dilatation.	
	Pa	iP iS L M ₁ M ₂ M ₃ F	19 41 37 49 41 57 58-59 20 04 9-10 22,3			8 11 36-40 13-28 15		7 9 75 82 76		6520		
10 »	St	L F	2 23 41								V. Galitzine.	
10 »	Al	e(P?) S(?) L M M M F	2 50 29 2 52 49 53 20 54 00 55 20 56 30 3 25			11 13 13		25 12 16		(1320)		
	Pa	eL M ₁ M ₂ F	2 56 58-59 3 02-03 3,3			17-18 10-18	11 12	12 8				
	Be	L F	2 56 3 09								Forte ag tation.	
12 »	St	eL M F	13 56 14 08 00 51			20			+14			
	Al	eL M M M F	13 59 14 01 30 04 07 30 13 30 30			25 20 18 16	12 8 4	18 10 4				

Tananarive indique e P 2^h
30^m 40^s 2660^{km} peut-être
réplique du précédent.

Limite du Chili et Argentine
Ressenti dans la province
de Coquimbo et Atacama
(Chili)
La Paz i P 13^h 09^m 57^s 1455^{km}
Sucre i P 13 09 40 1190
d'où
Epicentre 29° 5 S 68° 2 W

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
2 Janv. (suite)	Pa	eL M ₁ M ₂ F	14	01		20-22 18-19	7 9	16 11				
			14,5									
	Pa	e(P) e(S) (L) F	0	17	37	8-9	1	1				Belgique Ressenti en Belgique (ré- gion de Liège) dans les pays Rhénans et le Lim- bourg Hollandais.
			18	35								
			19	05								
			21									
	St	P P R ₁ P R ₂ P R ₂ P S F	0	17	43					250		Uccle P 0h 17m 54s 100km
					51							
					54							
			18	02								
					06							
					16							
			20									
	Be	e F	0	19	21							
					54							
	Ba	e i M F	5	29	21						E. » N. et E. N.	France Ressenti dans la région de Pau et Oloron-St-Marie non à Bagnères.
					25							
					34							
			30	00								
	St	eL F	13	08							V. Galitzine. »	Pérou Environs de Lima La Paz i P 12h 24m 35s 1065km Ressenti sur la côte du Pé- rou et à Lima.
					54							Algérie
	Al	P S F	18	01	58		(3)	(2)		40		
					03							
					30							
2 Janv.	St	e(P?) e ₂ e ₃ e ₄ e ₅ eL F	0	21	39							Italie Trenta Cosenza P 0h 19m 50s
					12							
					43							
					15							
					35							
			26									
			28									
21	St	e ₁ e ₂ eL F	7	40	14							Région Méditerranée Données incomplètes
					17							
					47							
					52							
	Be	e	7	40	37						Forle agitation masquant les autres phases.	
	Pa	e F	7	41								
			8,0									
27	St	e F	3	13							Pas d'int. de minute.	Ressenti en Bade et en Suisse (Zürich, Berne) Epicentre Dinkelberg (Bade) Zürich i P 3h 13m 08,6
					15							
30	Al	e S(?) L(?) M M F	3	28	13							Océan Indien Tananarive i P 3h 19m 34s 1800 km Batavia i P 24m 42s
					38							
			4	01								
					30	17	6	12				
					30	16		15				
					45							
	St	eL F	4	10							Gal. très forte agitation.	
					29							
	Pa	eL M F	4	11		15-17	4	5				
					20-21							
			4,7									
3 Févr.	St	iP m S L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄	13	57	00					5900	Dilatation.	Nord-Ouest Sibérie
					00	3			7			
			14	04	31							
					13							
					25	11			+12			Zi-Ka-Wei P 13h 55m 09
					00	10						4170 km
					00		-9					Victoria P 57 38
					25	10			+11			
					35	10			+7			

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicertrale probable
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ			
3 Févr. (suite)	St	M ₅ F	15	29 20	00	7		+9				
	Pa	iP L M ₁ M ₂ F	13 14	57 18	06	21 16-17	12	17 12				
	Be	P L F	13 14	57 16	12							
	Al	iP S L M F	13 14 14	58 07 22	22 10	14	3	4	7370			
4 "	St	eL M F	7 8	09 23 00		16		+9		Galitzine.		Pacifique
	Pa	eL M F	7 7,7	17 24-25		21-22	12	12				
6 "	Pa	eL M F	4 5,2	45 49-50		26		56				Océanie Ressenti S W Mindanao Manille e P 3 ^h 54 ^m 34 ^s 2270 km
	St	eL F	4	47 59						H. Galitzine.		
7 "	St	eP eS L M ₁ M ₂ F	0 1	14 24 40 58 59 50	13 40	15 16		-24 +19	9330			Océan Indien Epicentre 0°, 5 S 87°, 5 E d'après Batavia i P 0 ^h 5 ^m 58 ^s 2140 km Phu-Lien iP 7 44 3140 Tananarive iP 9 43 4833
	Al	eP iP PR S L M M F	0 1	14 18 25 45 58 01 20	33 41 06 15	17 17	7 7	10 8	9650			Kew indique le même épi- centre d'après Phu-Lien, Helwan, Strasbourg.
	Gr	(e) eL F	0 1	14 40 (20)	4(0)					N., très faible, traces.		
	Be	eP S L F	0	15 25 52	13 02					Masqué par l'agitation.		
	Pa	e L M F	0 1 1,7	25 52 06		16-17	12	17				
7 "	Gr	e S? F	23	29 32	25 39					Faible.		Région Corse Ressenti à Ajaccio
	PD	e i F	23	29 30 33,5	56 48					N., faible.		
	St	e ₁ (P?) e ₂ (S?) F	23	30 31 33	21 56					Phases faibles et douteuses.		Florence e 23 ⁿ 28 ^m 11 ^s Roca di Papa eP 28 37 450 km

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicroentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
7 février (suite)	Ba	eP S F	23	30	26 31 34							
10 »	Pa	eP iS L F	4 5 (21) 6,0	50 01	56 11	5		13		9100		Sud du Mexique Région Puebla D'après J. S. A. 19°, 8 N 98°, 5 W, U. S. C. and. G. S. 19°, 0 N 98°, 0 N
	Be	P S	4 5	51 01	07 41						Autres phases masquées par l'agitation. Dilatation.	Cincinnati i P 4h 43m 42
	St	iPv i L F	4 5	51 01	10 48 10						Perdue dans l'agitation.	
	Al	P S(?) L M F	4 5	51 01	17 45 18 19 30 35	22		3		(9350)		
11 »	St	eP(?) e(S?) F	1	31	04 32 27 34					760	Grand pendule. » »	Côtes de Dalmatie Région Nord de Zara Spa- lato 44° N 15°, 5 E d'après Zagreb P 1h 29m 36s 200 km Belgrade e P 30 00 Rocca di Papa e P 30 04 Inscrit par Alger seulement
	Be	e F	1	32	32 35							
11 »	Al	eP S m F	18	29	14 30 21 25 37	3	2	2		610		
13 »	St	e(PS) e(L?) F	6	02	28 51						V. Galitzine. Galitzine.	Pacifique Région de l'île de Guam d'après Manille iP 5h 38m 28s 1995k Sumoto eP 38 34 2730 Batavia iP 41 13 4420
	Pa	eL M F	6 6,9	33 34		17 18	4	4				Longues ondes seulement dans les stations Euro- péennes.
19 »	St	eL F	22	32	38						Galitzine. »	Longues ondes seulement Almería indique Alaska d'après une dépêche de Seward (Alaska à Geor- getown).
21 »	Pa	iP iS L M ₁ M ₂ F	19 20 20 26-27 39-40 21,6	59 08	40 13	8		6				
						20-22 15-17	9 16	13 5				
	St	iPv m ₁ iS m ₂ L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ F	19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22	59 08 13 13 30 35 39 41 43 46 48 49 00	41 41 20 20 02 57 20 30 30 10 15 20	3			-10	7200	Compression.	Tchouktches Nord Est Sibérie 65° N 173°, W d'après Victoria i P 19h 55m 26s 3360 km Ottawa P 55 26 Zi-Ka-Wei i P 58 20
	PD	eP eS eL F	19 20 21	59 08	54 46 48						E. » N. E.	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N	A_E	A_Z			
							μ	μ	μ			
21 févr. (suite)	Al	eP S L M F	20 00 53 10 37 26 44 21 20	18	5	8	8450					
	Be	eL F	20 21 21 12									
23 "	St	e F	11 14 27					V. Galitzine. »	Données insuffisantes			
24 "	St	e(Pv) e(S?) L F	11 31 06 35 40 45					V. Galitzine. H. Galitzine. Galitzine. »	Asie Mineure Caucase ?			
	Al	P e eL F	11 31 18 35 12 36 10 40									
24 "	St	e(P?) L F	14 21 35 45					Verticaux. Horizontaux.	Réplique du 21 février ?			
	Pa	eL M F	14 45 15 00 15,6	15-17	5	4			Victoria P 14 ^h 17 ^m 41 ^s			
25 "	St	eL F	11 53 12 18					Galitzine. »	Pacifique Manille e P 10 ^h 58 ^m 32 ^s Sydney P 11 05 24 La Paz P 15 17			
	Pa	eL F	12 06 17									
25 "	St	e(P) F	17 32 01 40					Verticaux.	Données insuffisantes			
26 "	Pa	eP L M F	1 04 36 10 10-11 20	10-12	1	1			Inscrit aussi par Uccle et Neuchâtel.			
	St	e(P) eL F	1 05 25 12 dans le suivant						Océan Arctique Nord du détroit de Bering ? Sitka 1 ^h 23 ^m 48 ^s 2170 ^{km} peut être réplique du 21 C			
26 "	St	eP iS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ F	1 29 47 38 33 46 56 30 2 00 00 03 30 05 00 14 00 3 20	15 15 16 14 14		+8 +8 -12 +7 +10	7340					
	Pa	eP eS L M F	1 29 48 38 29 50 2 09 3,3	7-18	6	10	7240					
	PD	e e(S) F	1 32 34 39 38 2 40					N. »				
	Be	eL F	1 49 2 30									
28 "	Pa	traces	0 04-08					Vertical.				
28 "	St	eL F	2 52 3 30					Galitzine. »	Longues ondes ou seule- ment émergences dans les diverses stations.			
	Pa	eL F	3 02 20					Vertical.				

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
févr.	St	eL F	9	06	41						V. Galitzine.	" "
"	Pa	eL F	10	06	10,6						Vertical.	" "
"	St	eL F	23	20	0 10						Galitzine.	Ressenti aux Etats-Unis dans le territoire de Mon- tana.
"	Pa	eL M F	23	26	42-43 24,0	19		5				Sydney signale aussi un séisme P 22 ^h 02 ^m 30 S 08 54 Longues ondes
mars	St	eL F	21	44	22 05						Galitzine.	Données insuffisantes
"	Pa	eL F	21	45	22,1						Vertical.	
"	Pa	traces	10	16-25							"	
"	Al	eP iP S L M M F	10	57	37 39 59 36 11 00 10 01 11 05 30 30	16 10	3	10 3		1110		
"	Gr	P i S F	10	57	40 51 59 43 11 10					1150	E. " "	Sud Italie Epic. en mer entre les îles Eoliennes et le cap Vaticano Maisons écroulées à Strom- boli. Reggio, Messine, Milazzo VIII IX. Ressenti jusqu'à Gallipoli, Golfe de Tarente. 38°,3 N et 15°,5 E
"	Be	iP e(S) F	10	57	52 11 00 04 22							
"	St	iP R ₁ P iS m ₁ R ₁ S R ₂ S m ₂ L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	10	57	56 58 50 11 00 19 01 20 30 41 45 02 15 03 00 04 00 05 10 30	10 6 5-7 5 10 9		+20 +18 +24 -39 +29 +10		1310	Compression.	
"	PD	i P e (S) e F	10	58	00 11 00 24 36 11 14					(1360)	N. et E. N. E.	
"	Ba	P eS F	10	58	12 11 00 46 20					1470	N. "	
"	Pa	iP eS L M F	10	58	27 11 01 (15) 22 24 11,6	4 8-9	3 8	6 10		1620 ?		
7-8	St	e(P?) e(S?) eL M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆	22	54	23 03 15 20 45 22 00 45 24 15 30 25 50	7 10 15 9 13-14 12	-11 +11 +9		-6 -13 -11		V. Galitzine. Distinct.	Chine Région Ordos Epicentre vers 101° E 41° N

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable	
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ				
7-8 mars (suite)	St	M ₇	27	00		11		+12					
		M ₈		25		10	-10						
		M ₉	28	30		12		+10	+10				
		M ₁₀	29	35		12							
		M ₁₁		50		10		-7					
	Be	F	0	22									
		eP	22	54	19						Très faible.		
		L	23	19									
	Pa	F		45									
		iPv	22	54	28					7600 ?			
		e(S)	23	03	28								
		L	(17)										
	Al	M	20-21			20-22	9	7					
		F	0,3										
		eP	22	55	04								
		eS	23	05	41					(9540)			
8 »	St	eL		24									
		F		32		16		3					
	Pa	eL	18	35							Galitzine.	Données insuffisantes La Paz i P 18 ^h 01 ^m 07 ^s	
		F	19	19							»		
	Pa	eL	18	43									
		F	19,1										
	Pa	eL	1	20									
		F	1,7									id SumotoeP 0 ^h 30 ^m 06 ^s 2440 ^{km}	
	St	eL	1	20							Galitzine.		
		F		47							»		
9 »	St	e(P)	11	12							V. Galitzine.	Océanie Nord des Moluques vers 1° N 130° E ressenti à Tobelo (Halma- hem).	
		e(S)		22							V. E. Galitzine.		
		eL		40							Galitzine.		
		F	12	29							»		
	Pa	ev	11	22	54								
		L	12	01									
		F	12,3										
	9 mars	St	P	18	18	05					9400	Dilatation.	Océan Indien 1° S 89°, 5 E Ressenti dans la région d'Atzeh(Nord de Sumatra)
			PR ₁		21	42							
			PR ₂		23	55							
iS				28	35								
PS				29	30								
SR ₁				38	50							BataviaiP 18 ^h 09 ^m 40 ^s 2040 ^{km}	
L				41								BombayiP 11 08 3000	
M ₁				46	30	16		+87				Phu-Lien P 11 28 3200	
M ₂				50	00	18		+200				Tananarive iP13 42 4790	
M ₃				52	40	15		-140				Zi-Ka-Wei i P 13 52 7070	
M ₄				53	00	16	+125						
M ₅				55	20	14	-87						
M ₆			19	00		14			-80				
M ₇				04		20	+300						
M ₈				40		15		+54					
M ₉				01	04	20	-280						
M ₁₀				02	30	18	+123						
M ₁₁				03		15			+115				
M ₁₂				08		16		+87					
M ₁₃				04	30	18	+140						
M ₁₄				05	44	12		+39					
M ₁₅				06	36	18	+123						
M ₁₆				08	36	16		+87					
M ₁₇			19	09		14			+61				
M ₁₈				19	32	14		+36					
M ₁₉				23	30	14	-39						
F			22	30									
9 »	PD	P	18	18	08					9600	E.		
		PR ₁		21	41						»		
		S		28	4(8)						N. E., int. min.		
		PS		29	52						E.		
		SR ₁		34	31						»		

Sta tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
		h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
Be	eL F	21	42							N.	
	eP	18	18	14							
	PR ₁		21	48							
	iS		28	53							
	L		39								
Ma	M	18	56						9400	N. E. » N. E. »	
	a	19	14								
	F	21,0									
	eP	18	18	14							
	P			16							
Gr	S		28	44							
	i			48							
	PS		29	50							
	SR ₁		34	08							
	eL F	21	47								
Al	eP	18	18	1 (5)					9450	N. et E., int. min.	
	S		28	48						N. E.	
	eS			5 (4)							
	eL ²		41,5								
	F	20	00								
Pa	P	18	18	21					9560		
	PR		21	56							
	iS		28	59							
	m		29	20	10	80	35				
	m		35	15	20		160				
	L		47								
	M		50		20	150					
	M		56		21	110	70				
	M	19	03		18	100	70				
	M		19		18	35					
Ba	F	21	20								
	eP	18	18	24					9410		
	iP		18	34	5		12				
	iS		29	05	10-13	41	52				
	SR		35	10	20		140				
	L		42								
	M ₁		57-58		22-26	160	70				
	M ₂	19	5-6		18-22	100	150				
	M ₃		10-11		20-22	120	160				
	W ₂	20	52								
Pa	F	22,5									
	P	18	18	39					9450	E. E., int. min. E. » N. et E. N.	
	PR ₁		22	1 (5)							
	S		29	12							
	PS		30	40							
Pa	SR ₁		35	35							
	eL F	21	42								
	eL F	4	15							Vertical.	Pas d'autre donnée
	F	4,6									
	traces	17-18									
St	e ₁	18	50	46						Galitzine.	
	e ₂		52							V. Galitzine.	
	L	19	05							N. »	
	F	21	08							Ondes irrégulières.	
	F										
Pa	eP	18	50	54					7600		
	PR		54	12							
	iS		59	54							
	L	19	31								
	M ₁		31-32		48		37				
Al	M ₁		40-41		23	7					
	F	20,8									
	e	18	51	12						Phases incertaines.	
	PR(?)		54	25							
	m		55	10	5						

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
17 mars	St	eL F	15	09	37						V. Galitzine.	Océan Indien ?
	Pa	eL F	15	17							"	Tananarive i P 14 ^h 27 ^m 29 ^s 2740 km
17 "	St	e ₁ e ₂ F	19	45	47					670 ?	Grand pendule. Grand pendule, Galitzine.	Bosnie Côtes Dalmatie
	Pa	traces	19	50								
18 "	St	eP L F	3	22							Gd pend., vert., V. Galit.	Océanie Wellington i P 3 ^h 04,8 Batavia i P 3 ^h 12 ^m 28 ^s Manille e P 3 ^h 13 ^m 00 ^s réplique ?
	Pa	(P) L F	3	22	13							
18 "	St	e(P) L F	12	18							V. Galitzine. Galitzine.	Océanie Wellington i P 12 ^h 01,8 Batavia P 09 ^m 32 ^s Zi-Ka-Wei e P 10 ^m 42 ^s réplique ?
18 "	Al	eL M F	13	38		24 20		2				
18 "	St	eP eS F	23	51	49					1020	Grand pendule, verticaux.	Croatie Bains Lipik (VI-VII) 17° 10' E 45° 25' N d'après Zagreb
	Be	eP e(S) F	23	52	08							
	Pa	eL M F	23	55,5		8-7,5	3	2				Ressenti à Belgrade assez fortement e P 23 ^h 48 ^m 12 ^s 230km
19 "	St	e(P) e(S) eL F	10	11	05					(5680)	V. Galitzine. " V. E. Galitzine.	Réplique du précédent et en même temps séisme éloigné. Golfe d'Arabie ?
	Al	e S (?) L M F	10	11	08						V. Galitzine. V. E. Galitzine.	Ksara P 10 ^h 07 35 3400km Helwan e P 38 Alger 11 08 Tananarive 14 16
	Pa	eL F	10	31		20	15	5				
19 "	Al	P S F	17	59	34		(1)	(1)		80		Algérie Région de Tizi-Ouzou
22 "	LM	iP iS L M	4	29	10							Mexique Côtes d'Oaxaca 14° N 95° 5 N Destructeur au Mexique
	Pa	iP iS M L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	4	29	30					9280		J.S. A. 14° 5 N 95° 8 W U.S. Cand. G.S. 14° N 95° W Quelques victimes à Po- chutla, panique à Mexico et dans les états d'Oaxaca Guerrero ; à Puebla, Vera Cruz et Tabasco
				39	54	10-13 13-16	20 65	27 86				
				40-41		25-27	180	300				
				53		18-22	120	710				
				59-60		20-18	190	490				
				05-06		20-20	110	360				
				06-07								
				08-09								
				8,6								
	Ba	eP	4	29	32						N. E. N. E., faible.	
		eS		39	55							
					58							

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
22 mars	Ba	PS	40	52							E. N. et E.	
		eL	56									
		M ₁	5	02	43	21	-440					
		M ₂	03	52	20							
		M ₃	08-09	18			-110					
		F	7					56				
	Be	eP	4	29	42							
		i			50							
		R ₁		33	09							
		PS		40	15							
		L		55								
		M	5	03-06								
		F	6	20								
	St	iP	4	29	45						9400 Compression.	
		m			45	6			-79			
		iPR ₁		33	07							
		iPR ₂		35	18							
		ePR ₃		36	25							
		S		40	15							
		PS		41	00							
		M ₁	5	02	00	18		+225				
		M ₂			15	18			-296			
		M ₃		03	30	18		+255				
		M ₄		04	00	18	-182		+284			
		M ₅		06	00	15		+276				
		M ₆		08	00	15	+192					
		M ₇		09	00	18	+194					
		M ₈		11	00	15		+276				
		M ₉			10	15	-197					
		M ₁₀		12	20	15	+148					
		M ₁₁			40	15		+215				
		M ₁₂		15	30	15			-179			
		M ₁₃		17	40	15			+110			
		M ₁₄		19	00	15			-110			
			F	8	00							
		Gr	P	4	29	55						
	eS			40	16							
					19							
	eL			56								
				57								
	M ₁		5	04	47	21	-150					
	M ₂			05	57	21	+135					
	F		6	10								
	Al		iP	4	29	56				9550		
			iS		40	34						
L			59									
M		5	03		24	330	360					
M			08		18		200					
M			10	30	18		165					
M			12	30	17	150						
	F	6	50									
Ma	e	4	30	25				N. » » »				
	iS		41	15								
	eL		54									
	M	5	05									
	F	6	40									
23	Pa	i	21	20	18				Philippines W Mindanao d'après Manille Manille eP 20 ^h 13 ^m 47 ^s 880 ^{km}			
		L		36								
		F	22,2									
24	St	e ₁	11	05					V. Galitzine. » V. E. Galitzine. V. Galitzine.			
		e ₂		09								
		L		13								
		F		30								
26	Pa	traces	11	16-22					Vertical.			
	St	e	5	45				V. Galitzine. E. Galitzine.				
L			54									
F		8	00									

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ			
6 mars	Pa	e ₁ e ₂ L M F	5 46 00 54 56 6 27 33-34 7,1			25-24	11	14				
25 "	Pa	eL F	7 49 8,1								Longues à Kew, Uccle, Vic- toria.	
26 "	St	eL F	9 09 9 24							V. Galitzine. "	idem	
	Pa	eL F	9 12 9,4									
26 "	St	P i P R _{1,2} P? R _{1,2} P? iS i M ₁ M ₂ F	14 41 38 52 57 42 06 28 43 08 08 51 15 06				4 4	+126 -92	450		Nord de l'Italie vers 46° 3 N 12° 9 E	
	Be	P P iS F	14 41 49 42 09 43 50									
	Gr	eP S S R _{1,2} S F	14 41 59 42 59 43 14 43 50						580	E., faible. N. N. et E. "		
	PD	e ₁ ? e ₂ e(S?) iM F	14 42 1(2) 50 43 46 44 23 52							E., int. min. très faible. N. N. et E. N.		
	Ma	e(P) e S iM F	14 42 20 36 43 36 40 44 12 16 51						700	E. N. et E. N. E. " N.		
26 "	Pa	eP e eS L M F	14 42 29 43 12 44 13 44 38 45-46 53			8-7	26	14	960			
27 "	St	eL F	6 00 27							V. Galitzine. "		
27 "	St	iP iP R _{1,2} P? R _{1,2} P? iS i M F	8 33 33 48 52 34 01 23 37 36 00 9 40						450	Dilatation	Nord de l'Italie 46° 20 N 13° E Même épicentre que le pré- cédent. Destructeur dans les Alpes Carniques et Juliennes, dans la région de Tol- mezzo; à Frioul (Udine). Intensité VIII-IX Vallée du Pô. Ressenti à Graubunden, dans la Suisse centrale et le Tessin II-III.	
	Be	iP iP S F	8 33 43 59 34 36 9 10			6	+145					

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
27 mars	Gr	iP e i iS iS m ₁ m ₂ F	8 33 50 5(4) 34 45 35 56 35 19 26 36 48 53		6 7		+180 -120		600	E. N., faible. E. N. N. et E.		
	Ma	e ₁ (P) e ₂ e ₃ i (R ₁ S) F	8 34 13 20 35 06 36 02 06 50						(700)	E. N. et E. N. E. N.		
	PD	eP e (S) i M F	8 34 19 53 35 45 36 09 11 30 9 00						(790)	N. et E. N. E. N. N.		
	Pa	eP e eS L M ₁ M ₂ F	8 34 22 59 36 04 36 37-38 38-39 9,6		8-9 5-4	180 79	140 57		940			
	Ba	e ₁ ? e ₂	8 34 57 36 27 31							E. N.		
27 "	Ba	eS i F	8 37 27 37 43 9 00							N. et E. N.		
	Al	e L M M M F	8 35 20 39 40 40 30 43 00 50 30 9 00		15 9 8	10 5 3	10 4			Forte agitation		
27 "	St	e(P) eS eL F	19 20 15 30 (40) 57 20 50						9300 ?	V. Galitzine " V. et E. Galitzine	Océan Indien Région Réunion	
	Al	eL M M F	19 54 20 00 03 30 10		19 15	16 8	16 7				Tananar. 19 ^h 10 ^m 54 ^s 1300 ^{km} Batavia 15 35 5900	
	Pa	eL M F	20 00 11 20,4		18-19	6	3					
27 "	St	eL F	21 26 40							V. Galitzine		
28 "	St	eL F	13 20 26							" "	Japon ?	
	Pa	traces	13 21-25									
28 "	St	e F	14 22 (40) 24							Grand pendule	, réplique	
29 "	St	P S m i (PS) i (SR?)	5 18 12 27 (53) 28 31 29 25 31 04		9	+18	-9		8420			

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
29 mars	St	eL	6	41								Japon S W des îles Hatizyo d'après Kobé 5h 07m 16s 423km Toyooka 27 473 Nagasaki 50 688
		M ₁	6	05	46	14			-10			
		M ₂		06	26	14			-10			
		M ₃		11	03	14			+8			
		F	7	30								
	Pa	ePv	5	18	27					9100		
		iS		28	40	8-8	4	11				
		SR		34	47	11-13	3	11				
		L		57								
		M	6	06-07		15-16	6	8				
		F	7,0									
	Al	eP	5	23	18							Italie réplique ?
		S?		29	05							
		L		33								
		M		37	15	12		8				
		M		42	05	11	5					
		F		57								
20 "	Be	eS	5	28	33							
		SR		34	52							
		L		57								
		F	6	30								
20 "	St	e (P?)	14	53	33					450 ?		Région d'Aumale
		P?			43							
		e(S?)		54	21							
		i(R,S?)			47							
		F		57								
20 "	Al	P	19	18	04					80		
		S			14		(1)	(1)				
		F		20								
30 "	St	traces	1	13-14							Grand pendule	
31 "	Gr	eP	0	33	4(8)					1940	E. int. minute	Asie Mineure 38° N et 27° 5 E
		eS		37	06						N.	
		S			10						E.	
		eL		38							N.	
				39							N.	
		F	1	00								
	St	P	0	33	54					1990		
		iS		37	16							
		m ₁			33	6	-47					
		m ₂			52	6	-33					
		L		38,5								Destructeur à Smyrne et Torbali. d'après Helwan P 0h 31m 54s Rocca di Papa P 32 41 Hambourg iP 34 16
		M ₁		40	24	11	-266					
		M ₂			35	11	-122					
		M ₃		41	53	9	-221					
		M ₄		42	45	10		-150				
		M ₅	0	45	19	9	+100					
		F	2	30								
	Be	P	0	34	01							
		S		37	27							
		L		39,6								
		F	1	15								N. et E., int. min. E. N. E.
	Al	iP	0	34	15					2160		
		iS		37	52							
		L		41								
		M		42	30	14		6				
		M	0	44	20	13	17					
		M		48		11	15	12				
		F	2	00								
	PD	iP	0	34	2(1)					2320		
		S		38	11							
		L		40								
		M ₁		41								
		M ₂		42	56	12		+58				
		F	1	06	44	12		+89				

Seismological
Centre

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
31 mars	Ma	eP S L eL F	0	34	33 38 54 41 25				1980	E. N. N. et E. N. E.		
	Pa	iP eS L M ₁ M ₂ F	0	34	35 38 27 41 42-43 44-45 1,9	13-14 10-14	270 110	180 84	2340			
	Ba	P M ₁ M ₂ S L F	0	34	38 40 29 41 42 56 44 42 2	16 12	+73 -64		2330	E. N. N.		
31 »	St	e(P) eL F	5	16	33 22,5 30						réplique ?	
	Pa	e F	5	24,1	32							
1 ^{er} Avril	Pa	eL F	18	56	19 15						Longues ondes	
	St	eL F	18	57	19 13					V. Galitzine »	Manille e P 17 ^h 55 ^m 56 ^s	
2-3 »	Pa	eL F	23	54	0 09					Vertical	Longues ondes à Uccle	
3 »	St	e(P) eL F	16	53	(19) 17 11 50					V. Galitzine Galitzine »	Atlantique Région Sud ile Ascension	
	Al	eL M F	17	06	09 25	15	30	25			Sucre P 16 ^h 51 ^m 40 ^s 5410 ^k Granada iP 16 51 54 6000	
	Pa	eL M ₁ M ₂ F	17	14	15-16 20 21 17,8	22 21	15	20				
6 »	Al	eP S F	0	13	37 47 15				80		Algérie Région Médeah Boghar	
7 »	St	e eL F	20	52	21 07 30					V. Galitzine. Galitzine »	Région Amérique du Sud Sucre P 20 ^h 19 ^m 16 ^s 5210 ^k La Paz iP 20 19 53 5590	
	Pa	eL F	21		21,6						Sucre indique 66° S, 74° W	
8 »	Al	eP S F	22	26	52 27 14 28	(1)			200		Algérie Région Bougie, Kerrata	
9 »	Al	iP PR S eL M M M F	17	46	51 08 13 18 16 22 28 30 32 19 30	20 18 15	7 10 7	15 10 5	9230		Pérou Destructeur dans la région de Macusani et Ituata. (District de Puno) Ressenti à La Paz (III)	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
9 avril (suite)	Ba	eP e(S) eL F	17 46 55 18 57 22 18 13 19						9340	N. N.	La Paz i P: 17h 35m 15s 14° S, 70° 4 W	
	Pa	ePv L M ₁ M ₂ M ₃ F	17 47 12 18 14 15-16 22-23 26-27 19,7		32 19-23 18-19	11 18	24 21 20					
	St	iP L M ₁ M ₂ M ₃ F	17 47 13 18 05 31 30 33 30 35 30 19 50	17 15 16		+21 -17 +16		Dilatation V. Gal. H. irrégulières				
	Be	eL F	18 19 55									
	St	traces F	1 15 17						V. Galitzine "	Buda-Pest e P 1h 09m 35s		
	Pa	traces F	1 16 21									
	Al	eP iS F	18 33 23 26 34	(3)	(3)		25		Algérie			
	12	St	e eL F	18 48 19 02 45					V. Galitzine Galitzine "	Région Chili 30°,7 S 71°,8 W d'après Sucre iP 18h 11m 23s 1290km La Paz P 11 41 1445 LaPlata iP 15 23 1570		
	13-14	Pa	eL M F	19 02 10-11 19,7	18		3					
	13	Al	LM	9 40						traces		
13-14	Pa	ePv eS L M F	23 28 44 39 14 0 04 0 05-6 1,0	20		5		9400		Pacifique Amérique centrale Côte sud Ouest Mexique 13° N, 95° W Tucson iP 23h 21m 05s 2560km		
	St	P (eS) L F	23 29 00 39 29 55 1 00					9370	V. Galitzine Compression			
	Al	eP? PR S L M F	23 29 23 32 23 39 51 0 01 15 35	18	2	2	(9560)					
	St	iP eS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ M ₉ F	9 03 15 06 12 08 08 00 30 09 30 11 00 30 12 00 30 13 30 15 00	(6) 6 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	-160 -180	 -120 -120 -120 -120 -130		Dilatation Plumes sorties sur H. Wie- chert et N. Grand pen- dule. Les mesures de pé- riodes sont douteuses par l'enchevêtrement des ins- criptions.	Bulgarie Séisme destructeur à Tschirpan. 42° 15 N 25° 15 E d'après Athènes Ressenti à Salonique, Ko- motini, Serrai, Alexan- droupolis. Belgrade eP 9h 01m 00s,1 610km			
	Be	P S L	9 03 27 06 25 08									
			dans le suivant									

3

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
14 Avril (suite)	Be	M		09	10							
		F	10	25								
	Gr	P	9	03	29					1690	N.	
		iS		06	24						Plumes sautées	
	Ma	P	9	03	32					1840	E.	
		e			35						N.	
		iS		06	41						»	
		L		07							»	
				07,5							E.	
		M ₁		09	10	14						
		M ₂		10	04	13						
		F		?							Changement de feuilles.	
	PD	P	9	03	46					1920	E.	
		iP			54						N.	
		iS		07	02						»	
		L		09								
		M ₁		10	49	11		+340				
		M ₂		12		9		-330				
		M ₃		13		8	-310					
		F	10	20								
	Pa	iP	9	04	01	7-8	6	30		1980	A impressionné le magné-	
		iSn		07	22						tographe du Val-Joyeux.	
		M		7,5		7-21	9	50				
		L		09								
		M ₁		10	11	8-10	(300)	(360)			Amplitudes	
		M ₂		12-13		12	(490)				douteuses :	
		M ₃		13-14		10	(360)	(390)			le tracé dé-	
		M ₄	9	19-20		9-12	110	96			passe les li-	
		W ₂	12	25							mites des	
		F	12,7								feuilles.	
	Al	iP	9	04	11					1970		
		iS		07	31							
		m		08	00	7	150	110				
		L?			30							
		M		12	00	12	280					
		M		13	56	12		80				
		M		14	30	11	130					
		M		15	40	10		80				
		M		17	20	10	80					
		M		20	35	9		40				
		M		31	00	11	100					
		C				13	3					
		F	10	08								
			11	00								
	Ba	eP	9	04	17					2010	N. et E	
		S		07	41						N.	
		eL		08	(40)						N.	
				09	(20)						E.	
		M ₁		11	27	15	+500					
		M ₂		12	31	12	+365					
		M ₃			41	8		+150				
		M ₄		13	52	11	+340					
		F	11	10								
14 "	Be	e	10	30,9								Réplique du précédent
		F		42								
	St	P	10	31	29							
		F	11	35								Belgrade iP 10 24" 48" 650km
	Pa	e	10	32,0								
		L		34								
		M		35-36		8-7	4	3				
		F	10,9									
	PD	e	10	34							N., faible	
		F		40								
16 "	St	eL	9	29							V. Galitzine	
		F		47							»	

Date	Sta tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
16 Avril (suite)	Pa	traces F	9	30	43							
	Al	LM	11	01		30		1				
17 »	Pa	iP iS L M ₁ M ₂ F	3	37	41 47 49 4 00 05-06 12-13 5,4	7-6 35 22-19	6 5	20 33 17		8950		Amérique centrale Sud du Mexique 16° 2' N 95° 8' W d'après J. S. A. St-Louis iP 3h 30m 09s 2440km
	Be	P iS L F	3	37	54 48 18 4 12 30							
	St	iP m ₁ iS m ₂ L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	3	37	55 38 26 48 24 26 4 04 14 30 16 40 19 30 30 00 dans le suivant	6 7 17 18 16 15		-8 +8 -12 +9 +14 +12 +18 -8 -5 +10		9370	Dilatation. Irrégulières et faibles sur le N. S.	
	Al	P S eL M M F	3	38	03 48 21 4 06 09 23 50	25 17	15 6	20 6		9150		
17 »	St	e M	5	49	56						V. Galitzine Galitzine et Wiechert	Deux séismes simultanés Le premier dans les Balkans Belgrade eP 5h 48m 42s 1590k Le second en Amérique La Paz P 4h 46m 29s 400 km
	Pa	e F	5	58	6 03							
18 »	Pa	eL F	4	31	5,0							Amérique Spokane eP 3h 52m 08s St-Louis eP 18 Cincinnati e 57 06
	St	eL F	4	33	5 03						Galitzine	
18 »	Gr	P i R ₂ P? iS L M ₁ M ₂ M ₃ F	19	26	01 (22) 27 15 28 48 30 31 19 32 51 36 59 21	11 11 9	>+650 +490 -300			1610	E. » Int. minute. » N. »	Balkans, Bulgarie 42°30'N 26°38'E Destructeur en Bulgarie Effets catastrophiques Ressenti à Salonique, en plusieurs villes de Grèce et de Turquie et jusqu'en Italie, Venise III Athènes indique 42°18'N 24°48'E
	St	iP eS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ F	19	26	06 28 52 29 20 30 30 10 20 30 36 30 38 00 dans le suivant	(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)	+77 -210	+115 +100 -120 +160 -140	+87	1590	Dilatation Plumes sorties sur H. Wie- chert. Inscriptions em- brouillées, mesures de périodes douteuses.	
	Be	iP S L M F	19	26	15 29 06 30 32-33 21 10						Int. minute.	
	Ma	P iS	19	26	23 29 09					1490	N. »	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
18 Avril (suite)	Ma	eL	19	30,5								
		M	19	33	20	10	-570					N.
		F	21									
	PD	iP	19	26	35					1920		
		e			43							E.
		i	27		53							N.
		iS	29		51							E.
		L	31									N.
		M ₁	32			12	>-620					N. et E.
		M ₂	33	25		10		+320				
		F	21	20								
	Pa	iP	19	26	51					1960		
		iS		30	10							
		M		30,5		9	47	150				
		L		31,7								
		M ₁	32-33			11-9	(1000)	(320)				
		M ₂	34-35			8-10	(350)	320				
		M ₃	38-39			8-12	140	470				
		W ₂	22	30								
		F	23,2									
	Al	iP	19	27	01					1970		
		m			09	6	75	90				
		iS		30	21							
		m			30	7	40					
		m			50	8		45				
		L?		31	30							
		M		32	30	16	160					
		M		33	30	16		90				
		M		34	40	12	240	180				
		M		36	10	10	180					
		M			40	10		160				
		M		140	10	8	40					
		M		159		12	20	20				
		F	21	10								
18	Ba	iP	19	27	07					2070		N. et E.
		m ₁			17	8		-93				
		iS		30	36							N.
		eL		32								E.
				33								
		M ₁		34	06	10	+250					
		M ₂		35	23	8		+160				
		M ₃			50	10	+330					
		F	21									
	St	P	23	18	16					16-10		
		iS		21	03							
		L		22					+5			
		M ₁			30	6						
		M ₂			48	6	-27					
		M ₃		23	00	6		-12				
		M ₄			45	6	+20					
		M ₅		24	10	9		+13				
		F	0	00								
19	Be	eP	23	18	18							
		L		23								
		F		36								
	Pa	iP	23	19	53					2000		
		eS		22	16							
		L		23,8								
		M		25-26		7-6	3	3				
		F	23,9									
	PD	e ₁	23	21	51							N.
		e ₂		24	02							
19	St	F		34								
		e	1	17								
		eS?		18								
		L		19								
		F		30								
											Réplique	
											V. Galitzine. H. Galitzine. Galitzine.	
											Belgrade eP 1 ^h 02 ^m 28 ^s , 5680 ^{km}	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_2 μ			
19 Avril (suite)	Pa	e F	1	20	51							
	St	e L F	5	06	07 15						Galitzine. » »	Réplique Belgrade eP 5 ^h 00 40,3 500 ^{km}
	Pa	e F	5	10	17						Vertical.	
19 »	St	traces	10-13								Faible.	
19 »	St	e F	22	47	23 01							Réplique Belgrade eP 22 ^h 22 ^m 23 ^s ,6 640 ^k
20 »	St	e F	6	23	32						Galitzine. »	Réplique Belgrade iP 6 ^h 16 ^m 21 ^s ,4 680 ^{km}
22 »	St	e ₁ e ₂ L F	5	06	(30) 16 24 6 00						V. Galitzine, faible. H. Galitzine. Galitzine.	Zürich P 5 ^h 06 ^m 35 ^s ,3 Neuchatel iP 39,8 610 ^{km}
22 »	Pa	eL F	11	44	49							Longues ondes seulement.
22 »	Pa	eL F	12	51	56							
22 »	St	e F	19	09	18						Galitzine. »	
22 »	Be	e F	20	03	?							Bulgarie Belgrade eP 20 ^h 01 ^m 30 ^s 640 ^{km}
	St	e L M F	20	03	07 08						Galitzine. » »	
	Pa	e F	20	0(7)	dans le suivant.						Enregistrement de l'heure interrompu.	
22 »	St	iP S L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ F	20	17	29 20 29 21 23 00 23 30 24 00 30 50 25 00 21 30	(6) (6) (6) (6) (6) (6) 10	-158 +87 98+	-113 +89 +110 -78 +43	-42	1750	Mesures des périodes dou- teuses.	Grèce 38° N 23° E Destructeur à Corinthe, Ka- lamaki, Sutraki et Posdeo- nia où il y eut de nom- breux morts et blessés.
	Be	iP S M F	20	17	33 20 34 23-27 55							
	Gr	eP i M F	20	17	(35) 22 51 26 27 21	10		-37			E., faible, inter. des minutes E.	
	Al	P iS L M M M M F	20	17	38 20 47 23 26 20 29 00 31 00 21 05	13 11 10	4 5	7 6		1840		
	PD	P eL F	20	17	47 23,5 50						N. et E.	

Date	Sta- tion	Phase	Heure h. m. s.	T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
					A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
22 Avril (suite)	Pa	iP eS L M F	20 18 (06) 21 (36) (23,8) 24 25 21,6	4-5 8-9 13	3 23 130	9 12 67		2080	Enregistrement de l'heure interrompu.	
24 »	St	eL F	16 35 50						V. Galitzine.	Inscrit par les stations amé- ricaines.
	Pa	eL F	16 39 49						Vertical.	
24 »	St	e L F	20 29 32 54						V. Galitzine. V. E. Galitzine.	Japon? Taihoku T _{NE} 19 ^h 45 ^m 25 ^s Ressenti dans l'île Whole.
	Pa	e F	20 34 44						Vertical.	
24 »	St	eL F	22 25 53						V. Galitzine.	
	Pa	traces	22 26-33						Vertical.	
25 »	St	eL M F	0 39 40 55							Balkans, réplique.
25 »	Pa	eP L M F	1 34 41 41 41-42 48	12-13	5	2				
25 »	St	eP eS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ F	9 29 19 32 15 34 27 35 23 38 41 36 07 30 37 11 39 00 10 15	7 7 7 7 7 6 7 6 6	-31 +24 +24 +20 -18	+18 +13 +12		1700	V. Galitzine.	Ressenti en Bulgarie. Belgrade eP 9 27 02 690 ^{km} Zagreb eP 27 45 940 ^{km}
	Be	eP L F	9 29 (22) 33 50							
	Pa	eP eS L M F	9 29 57 33 25 35,7 39 10,2	8 9-13	3 12	3 10		2050		
	Al	P S L? M F	9 30 09 33 35 36 38 50	12-15	2	5		2030		
25 »	Al	P S F	10 03 24 25,5 40		(4)	(3)		12		Algérie
27 »	Be	e F	13 22 55 31							Coire iP ₁₃ 20 ^h 27,6 1160 ^{km}
	St	e F	13 23 37						Galitzine et Grand pendule.	
27 »	St	eL F	13 45 54						V. Galitzine.	Océanie ?

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable			
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ						
Avril	Al	eP?	20	47	48					(9090)		Pérou Nord de Ituala. 13°5 S 70°5 W La Paz iP 20h 35m 58s 465km Sucre iP 36 44 950 St-Louis iP 44 59			
		eS		58	06										
		eL	21	15											
		M		21	30	22	9	18							
		M		34		18	8	9							
	Pa	F	22	00											
		e ₁ (P)	20	47	58										
		e ₂		51	09										
		e ₃		58	48										
		L	21	14											
		M ₁		20-21		27		11							
St	M ₂		23-24		19	6	9								
	F	22	6												
	eP	20	48	08					(11800 ??)	V. Galitzine. Galitzine.					
	e(S?)	21	00	21											
	L		10												
M ₁		25	20	20			+14								
M ₂	21	32	00	17			+16								
Be	M ₃		34	00	15			-8							
	F	22	50												
	eL	21	21												
	F		40												
26 »	St	e(P?)	18	02						Galitzine.	Balkans Ressenti à Corinthe d'après Buda-Pest. Les phases sont trop peu nettes pour per- mettre de fixer l'épicentre				
		e(S?)		05											
		L		07											
		M ₁		07	00	6	-12								
		M ₂			50	7			-6						
	Pa	M ₃		08	50	6		+ 8							
		F		35											
		e(P)	18	03	04										
		L		09											
		M		10-11		7		4							
	Be	F	18,5												
e		18	07	00											
F			15												
29 »	Be	eP	9	52	58					2090	Grèce Réplique à Corinthe. Séisme ressenti. d'après Zürich (presse). eP 9h 52m 43s,8 1480km 37°9 N 22°9 E				
		eS		55	43										
		F	10	10											
		eP	9	53	32										
		eS		57	03										
	Pa	L		59,8											
		M	10	00-01		13	7	4							
		F	10,4												
	30 »	St	traces	13-14						E. Galitzine.		Japon Osaka P 11h 06m 41,6s 736 km Sud de Amakusa Nade. Amérique du Sud Région Chili-Argentine. d'après La Plata P 0h 14m 28 Sucre iP 15 25 1945km La Paz iP _N 15 50 2180			
St		eL	11	54					V. Galitzine.	Mer Arctique Région Terre Wrangell? Scoresby-Sund P 19h 02m 30s Washington iPz 19 04 29 Uccle eP 19 05 04 6960km					
		F	12	00											
Pa		traces	12	00					Vertical.						
1er Mai		St	e(P?)	0	30								V. Galitzine. E. Galitzine.		
			e(S?)		40										
			L	1	06										
			F		50										
Pa	eL	1	08						21			2	2		
	M		13-14												
	F	1,5													
1er »	Pa	e	19	05					17-19	3	4				
		L		29											
		M		42-43											
		F	20,5												
	St	eP	19	05	23				7250	V. Galitzine. H. Galitzine.					
		eS		14	05										
		eL		22											
		F	20	40											

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
2 mai	Al	eP iP S F	13	08	27 29 44 10		(3)	(3)		150		Algérie
2 "	St	P im ₁ PR ₁ iS m ₂ m ₃ SR ₁ m ₄ L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ F	21	58	35 42 56 00 03 11 23 30 03 04 40 05 25 30 30 50 10 30 50 30 07 30	7 7 6 6 10 12 10 10 10 10 10 10 9	+5 +27 +24 -13 -100 -133 +95 +58 +90 -88	+11 -17 +24 -13 -100 +48 +50	+15	2020	Dilatation.	Asie Mineure 40°5 N 30° E Dégats à Eski-Schehir et Ku- taia ; ressenti à Constan- tinople. L'impulsion im ₁ correspond à une compression qui fixerait l'azimut à 113°.
	Be	eP S L M F	21 22	58 02	45 17 04,5 06-08 35							
	Gr	P eS eL M F	21 22	58 02	47 12 18 04 06 54 35	12	+80			2020	E. N. E. N.	
	Al	P S L? M M F	21 22	59 03	08 03 17 09 30 12 00 25	11 11	4 4	4 3		2370		
	Pa	eP iS M L M ₁ M ₂ F	21 22	59 03	16 06 3,3 5,4 6,7 8,9 23,3	10-6 13-12 12-10	17 110 50	6 38 21		2320		
	Ba	e eS eL M F	22	(00) 03 06,5 08 30	29 27	14	+25				N., inter. heure.	
	LM	eP L M	22	01? 09 11	40 50							
3 "	St	e F	1	35 47							Galitzine. "	Données insuffisantes
	Pa	traces	1	39-45							Vertical.	
5 "	St	eL F	14	13 40							Galitzine. "	
	Pa	traces	14	20-26							Vertical.	
7 "	Ba	P iS M F	10	01 33 35 40 41 45 03						(50)	E. N. " E.	France (Basses Pyrénées)

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_L μ			
8 mai	St	iP i L F	4 5 6	56 59 14	55 56						Pas de S.	
	Pa	iP PR iS L M F	4 5 16 29-30 6,1	57 00 06 16	03 03 05	3-4 5 10	6 1	2 3 1	7650			Les stations Japonaises in- diquent la région Nord de Yeso, ile Etrup
	Be	P S	4 5	57 06	03						int. min. autres phases inappréciables.	
	Al	P e L M M	4 5 03 06	57 01 15 25	56 35 15 25	9 9	1	1				
10 "	Al	eP eS M F	23 35 36	34 06 16	32		(1)	(1)	300			Algérie, El Arrouch
12 "	Al	P PR S iP L M M F	20 36 42 45 49 50 54 21	35 27 08 08 49 30 30	52	6,7 15 12	8 4	6 4	4520			Océan Atlantique N E du rocher St-Paul vers 20° W 1° N d'après Cartuja Granada iP 20 ^h 35 ^m 34 ^s 4300km Alger P 35 52 4520 La Paz eP 37 09 5855
	PD	eP F	20 21	36 10	54						N. et E; pas d'autre phase nette.	
	Pa	eP PR eS L M F	20 39 44 55 56-57 21,7	37 11 33 55	10	22-15	5	4	5750			
	St	iP PR ₁ eS eL F	20 40 44 51 21	37 32 (55) 51 40					5960		Compression.	
	Be	traces à	20 21	53 12								
14 "	Ba	eP i S eL M F	22 37 50 23 1	27 34 55 01-02 20	28	24	25		9340		E. » » N.	Nord du Pérou 5° 4S 78° 5 W Destructeur à Chachapoyas. Nombreuses victimes au Nord du Pérou. Ressenti dans le district de Loreto Cajamarca. Lanbaycque, Libertad, Piura, Guyaquil.
	LM	eP S L F vers	22 38 23 35	27 30 01 35	30							La Paz iP 22 ^h 18 ^m 18,5 1675km Sucre iP 19 07 2160 Fordham P 23 06 5010
	Pa	eP iP iS M L M ₁ M ₂ M ₃ F	22 38 38-39 51 53-54 23 25-26 2,2	27 40 08 38-39 51 04-05 26	36	9-11 50 18-22 17-16	25 30 38	38 260 96 37	9440			

Seismologic
Centre

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable		
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ					
14 mai (suite)	PD	eP S eL M F	22 27 41 38 13 57 23 02 05 1 (00)			24		+86		9440	N. et E. E. »			
	Bc	eP S L M F	22 27 48 38 21 51 23 01-02 1 15											
	St	P PR ₁ PR ₂ eS PS eL M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ M ₉ M ₁₀ M ₁₁ M ₁₂ M ₁₃ F	22 27 52 31 47 33 47 38 30 45 53 23 05 00 08 00 12 20 14 40 15 00 16 00 17 00 19 40 21 00 35 00 38 20 39 00 43 05					+62 -43 -31 -34 -48 +43 -40 +40 +52 +31 -58 +43 +31 +31						
	dans le suivant													
15 »	Al	P PR S m eL M M M M F	22 27 31 31 02 38 10 30 53 23 05 11 18 30 22 1 30			7	8	14		9580				
15 »	Al	eP eS eL M F	2 49 01 59 25 3 19 26 4 00			21	12	10		9280	Nord du Pérou Réplique du précédent. 6° 0 S 79° 3 W d'après La Paz eP _N 2h 39m 48s 1745km Sucre iP 40 28 2180 Ottawa iP 45 13 5480 St-Louis eP 44 26			
	Pa	eP iP PR eS L M F	2 49 08 49 12 52 37 59 28 3 18 23-24 5,2											
	15 »	Be	eP	2 49 21									23-22	3
St		eP PR ₁ eS PS? L F	2 49 22 53 04 3 00 01 01 25 15 5 30											
15 »		Pa	e L M F	6 02 41 40 45-46 7,5			18	2	2		9590	V. Galitzine. Galitzine.		
15 »	St	e(P) eL F	6 02 (45) 38 Changement de feuilles (vers 7 h 40).			18	2	2		9590	V. Galitzine. Galitzine.	Sucre iP 5h 52m 26s 5220km La Paz iP 52 53 5480 Cartuja P 57 21		

Date	Sta- tion	Phase	Heure h. m. s.	T s	Amplitudes			△ km	Remarques	Région épicentrale probable
					A _N μ	A _E μ	A _Z μ			
15 mai	Al	S? LM F	6 10 13 7 39 20	18	3	2				
15 »	Pa	traces	8 48					(360?)	Vertical.	
15 »	St	e(P?) e(S?) F	14 04 48 05 28 06						Grand pendule. » »	Nombreuses secousses dans la vallée de l'Isonzo. Secousse de degré V dans les Alpes Carniques Montinars V Tolmezzo IV Udine III.
	Be	e F	14 05 27 07,4							
15 »	Bc	e F	21 26 19 27							Suisse Jura; près la frontière. Epicentre 46°,7 N 6°,7 E
	St	e ₁ e ₂ F	21 26 51 27 14 28							Ressenti dans la région d'Yverdon (Vaud).
16 »	St	e L F	8 20 42 9 30						V. et E. Galitzine. » »	Nord du Pérou Réplique. Chachapoyas. La Paz iP 8h 00m 27s 1760
17 »	Pa	e L F	11 24 41 12,3							Deux séismes simultanés. Batavia iP 11h 00m 13s Menado La Paz eP 10 54 54 655km 11° 4 S 74°,5 W d'après La Paz et Sucre.
	St	eL F	11 25 12 22						Galitzine. »	
19 »	St	eL F	0 17 21						V. Galitzine. »	Données insuffisantes.
19 »	St	e ₁ e ₂ eL F	3 40 4 05 5 19 50						V. Galitzine. » » »	Alpes, sans doute Tyrol ? Coire iP 3h 40m 23s,2 93km
	Pa	i(P) L F	3 41 01 5 07 5,8							
19 »	Al	P S F	3 54 36 38 55		(1)	(1)		15		Algérie
19 »	St	P S F	6 33 50 34 46 38					450		Alpes Carniques vers 46° 50'N 12° 40'E Ressenti à Tolmezzo et Gemona.
	Be	e F	6 34 42 36							Japon, Mer de Kasima
19 »	St	eP eS L F	9 43 51 54 (31) 10 14 11 10					(9600)		Kobe c 9h 33m 26s 638km Toyooka iP 33 31 Sumoto eP 33 34 627km
	Pa	eP e(S) L M F	9 45 54 55 35 10 18 19-20 11,2	22-23	5	4		(8400)		
	Be	traces à	10 27 11 00						N.	
20 »	St	iP eS L F	16 40 45 51 (18) 17 13 50					(9450)	V. Galitzine. N. Galitzine. Galitzine. »	Japon N.E Baie de Tokyo. Embouchure de la rivière Edo. Sumoto iP 16h 30m 17s 485km
	Pa	iP L F	16 41 55 17 16 17,8							

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
21 mai	St	eL F	3	05	15						V. Galitzine.	Emersions dans les stations américaines.
22 »	Pa	eL F	14	38	45						Vertical.	id
24 »	St	eL F	6	03	47						V. E. Galitzine.	Pacifique Région Amérique Centrale ?
	Pa	eL F	6	18	6,8						Vertical.	La Paz 1P 5h 43m 53s 3425km
26 »	St	e M F	5	57	6							Italie Côte d'Otrante Lecce II; à Squinzano se cousse ondulatoire res- sentie par un petit nom- bre de personnes.
	Pa	eP L M F	6	03	36 05,3 07-08 6,3	8	2	1				
26 »	St	eL F	8	52	9						V. E. Galitzine.	
	Pa	eL F	9	18	36							
26 »	St	eL F	14	47	15						V. E. Galitzine.	
	Pa	eL F	14	50	15						Vertical.	
27 »	St	iP m PR ₂ iS PS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ M ₉ M ₁₀ M ₁₁ M ₁₂ M ₁₃ F	10	02	46 52 07 51 13 10 40 29 37 50 38 30 41 35 42 30 43 40 44 00 45 30 46 30 48 00 20 50 40 52 10 13 50	4	+6	+4	-19	9250	Compression.	Japon 39° 36'N 143° 20'E Nord-Est de Miyako, préfec- ture d'Iwate; fortes se- cousse ressenties sur la côte à Iwate et Aomori, SS. de Kitakata-mara. Osaka P 9h 52m 20s,5 787km Kobe iP 52 22 1007 Sumoto eP 52 28 890
	Pa	iP iS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	10	03	00 13 24 30 30-31 33-34 42-43 43-44 14,3					9280 ?		
	Be	P S L M F	10	03	02 13 22 26 37-40 11 35						int. min.	
	Ba	e(P) eS eL M ₁ M ₂ F	10	03	06 13 3(8) 35 41 08 58 12 20	25 25	+130	+100		9440	N. N. int. min.	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable	
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ				
28 mai (suite)	Gr	eP	10	03	12					9380	N. et E. N. et E. int. min.		
		eS		13	4(1)								
		eL		30									
		M ₁		40	34	21							
		M ₂			53	19	+135	-53					
		F	11	30									
	Ma	eP	10	03	4(4)					9200	N. et E. int. min. N. et E.		
		eS		14	04								
		eL		32									
		M ₁		41	19	22							
		M ₂		42	57	18	-200	+210					
		F	12	15									
	Al	eP	10	03	47					9820			
		S		14	37								
		L		38		40							
		M		46		20	120	80					
		M		49	30	19	100	80					
		C	12	07		25	10	15					
F		13	20										
LM	P									Presqu'inperceptible.			
	eS	10	13										
	L		33										
	M		44										
F		11	05										
28 "	St	eP	7	00	53						V. Galitzine. »	Océan Atlantique ?	
		L		23									
		F	9	05									
	Pa	e(P)	7	01	31								
		L		54									
		M	8	08-09		18	3	1					
F		9,1								N. et E. »			
28 "	Ba	P	14	53	47							Séisme proche non ressenti à Bagnères.	
		i		51									
		F		54	(10)								
	St	eP	15	48	07								Japon, réplique. Est de Miyako, préfecture d'Iwate. Toyooka iP 15 ^h 37 ^m 36 ^s Osaka P 37 40 787 Kobe iP 37 41 908 Nagasaki eP 39 01,6
		(eS)		58									
		L	16	09		14	+14	+14					
		M ₁		28	25	14			+15				
		M ₂		31	00	14							
	F		17	30									
	Pa	e	15	58	41								
		L	16	22									
		M		29-30		20-19	25	9					
		F	17,4										
	Be	traces	16	25-38									
	Al	eL	16	27								Côtes de la mer Adriatique Epicentre probablement en mer à proximité entre Senigallia et Fano. Senigallia, S. Costanzo, Fano V Osimo, Ancône, Montecar- roto, Pesaro, Gabicce IV.	
M			34		20	4	3						
M			38	30	16		2						
F			45										
30 "	St	eP	20	03	19					840 ?			
		eS?		04	50								
		L		05									
		F		16									
	Be	e	20	03	24								
		F		08									
Pa	e	20	05	37							Japon, réplique. Kobe eP 7 ^h 27 ^m 51 ^s 896km		
	L		06,8										
	M		07,8		4-5	1	1						
	F		10										
31 "	St	e	7	38									
		eL	8	10									
		F		50									

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
1 ^{er} Juin	St	eL F	19	05							Galitzine.	Japon Même épicentre, longues seulement dans les sta- tions européennes.
	Pa	eL F	19	15								Kobe eP 18 ^h 23 ^m 51 ^s 803km Osaka P 23 52,2 Sumoto eP 24 11 898
1 ^{er} »	St	eL F	22	52							Galitzine.	Japon Même épicentre.
	Pa	eL F	23	00							»	Osaka P 22 ^h 08 ^m 37 ^s , 742km Kobe eP 09 19 Zi-Ka-Wei eZ 10 44 2390
2 »	Al	iP S	8	39	23		(12)	(18)		15		Algérie Région Stacueli
3 »	Pa	eL F	4	11							Vertical	Inscrit aussi par Uccle, Sco- resby Sund, Kem.
4 »	St	eP eS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ F	8	43	28					9230		Japon W S W des îles Simokosiki préfecture de Kagoshima.
				53	50							
			9	05		15		+19				
				18	30	12	+31					
				19	35	12	-9	-24				
				23	45	12			+24			
				25	00	12						
				25	25	13	-38	-50				
				26	00	13			-43			
				27	10	12		+19				
				29	00	12			-21			
			10	45								
	Pa	eP e e(S) L M F	8	43	47							
				47	08							
				54,3								
			9	17								
				27-28		16	31	24				
			10,6									
	Al	e LM M F	8	44	54							
				22		32	15	20				
				32		15	8	10				
			10	10								
	Be	e(S) M F	8	54	13							
				18-28								
				45								
	Ba	eL F	9	22							N.	
				50								
3 »	St	eL F	22	58							Galitzine.	Japon Longues ondes seulement dans les stations Euro- péennes. Sans doute répli- que du précédent.
			23	15							»	
5 »	St	e ₁ (P?) e ₂ (S?) L F	6	08							V. Galitzine. H. Galitzine.	Nagasaki P 21 ^h 36 ^m 45,2 146km
				19							Changement des feuilles.	Japon Réplique ; Est des îles Simokosiki
				41								
	Pa	eL F	6	44								
				7,2								
6 »	St	e(P) eL F	19	30							V. Galitzine. Galitzine.	Océanie ? Apia e 19 ^h 10 ^m 07 ^s 10°
			20	23							»	
			21	09								
	Pa	eP L F	19	30	16						Vertical.	
			20	30								
			21,2									
7 »	St	traces F	2	56							V. Galitzine faible. V. Galitzine.	Apia e 2 ^h 30 ^m 42 ^s
			3	00								
7 »	Pa	eL F	12	59							Vertical.	Un séisme destructeur s'est produit à Loutraki, près Corinthe.
			13	10								Belgrade eS 12 ^h 56 ^m 03,2 1080k
	St	e F	13	01							Galitzine.	
				11							»	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km.	Remarques	Région ép. centrale probable
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ			
8 juin	St	eP L M F	14 58 23 15 49 16 08 44 17 16		18			+6		V. Galitzine.		
	Pa	eP L M F	14 58 50 15 51 16 06-07 17,1		21-20	5	4					
11 »	St	eL F	9 44 10 09							E. Galitzine.	Pas d'autre donnée.	
13 »	Be	P iS F	7 55 57 56 32 59									
	St	P P S S R ₁ S R ₂ S F	7 56 (05) 17 58 57 16 23 40 8 02						480	V. Galitzine, int. min.	Italie Ressenti dans la région de Modène. Quelques dégâts à Gonraga et dans les vil- lages environnants, Soli- na VII, Correggio VI, Reg- giolo V, Suzzarra V, Mo- dène IV, Oropa II. Florence P 7h 55m 00s Zürich iP 55 29,3 Rocca di Papa eP 55 41	
	Pa	e ₁ e ₂ L F	7 57 24 58 37 59,5 8 01									
14 »	St	e F	16 48 17 05							Galitzine. »	Rocca di Papa e 16h 44m 36s Florence eP 47m 29s 1370km	
	Pa	eL F	16 55 17 04									
15 »	St	eL F	4 57 5 13							V. Galitzine. »	Données insuffisantes.	
	Pa	eL F	5 01 11							Vertical.		
15 »	St	P PR ₁ PR ₂ SP _c S S PS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ F	6 25 48 29 53 33 53 36 23 37 25 38 27 56 7 12 00 13 30 15 30 16 40 17 30 18 30 9 20						10900	Compression. N. S. irrégulier.	Océanie Philippines S W de l'île de Mindoro 13°3 N 120° E Manille iP _{NE} 6h 13m 12s 200km Phu-Liên P 16 25 1820 Batavia iP 17 49 3100	
	Pa	eP e ₁ e ₂ L M ₁ M ₂ M ₃ F	6 26 15 30 17 38 47 7 02 03-04 06-07 14-15 9,5		34-35 23 16-21	32 71 31	29 20 59					
	Al	e PR S? L M M F	6 26 52 31 12 38 33 7 08 18 25		18 18	15 15	15 8			Changement des feuilles.		
	PD	e eL F	6 38 7 02 50							N. »		

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
15 Juin (suite)	Be	eS L F	6	37	47							
			7	03								
				45								
15 »	St	eP PR ₁ eS L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ F	17	29	48					10500		Philippines Réplique du précédent S W ile de Mindoro Manille iPn 17 ^h 16 ^m 45 ^s 225 ^{km} Phu-Lien P 20 00 1740 Batavia iP 21 33 3110
				33	38							
				41	08							
				55								
			18	11	50	19		+29			N. S. irrégulier.	
				15	00	16			+26			
					30	15		-21				
				18	00	16			-21			
					30	12		+14				
				20	30	15			+15			
		F	20	00								
	Pa	eP PR eS L M ₁ M ₂ W ₂ F	17	30	01					10750		
				34	02							
				41	32							
			18	04								
				09-10		30 29	59	31				
				13-14		23-25	26	34				
			19	37								
			20,3									
	Al	e S? L M M F	17	30	36							
				42	17							
			18	12								
				22		20	7	5				
				27		18	10					
			19	00								
	Be	S L F	17	41							Traces.	
			18	07								
				40								
16 »	St	e ₁ e ₂ (PR ₁) eL F	18	47							V. Galitzine.	Océanie Manille i 18 ^h 33 ^m 42 ^s Batavia i 18 34 14 1520 Zi-Ka-Wei P 18 34 51 4780
				50							»	
			19	00							Galitzine.	
			20	40							»	
	Pa	eL M F	19	32								
				45-46		22	1	2				
			20,2									
17 »	Pa	iP iS M L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ F	3	32	02	13		32		9500		Amérique Centrale Etat d'Oaxaca (Mexique) Dégâts Côte d'Acapulco, en mer. 14°5 N 97° W Denton (Texas) P3 ^h 22 ^m 52 ^s 18°6 St-Louis iP 24 33 24°5 La Paz iPe 27 31,5 4780 ^{km}
				42	37							
				43-44		11-16	38	115				
				54								
			4	01-2		29-27	200	340				
				03-4		25-23	120	640				
				04-5		20-22	240	630				
				05-6		23-21	190	460				
				10-11		19-17	200	350				
			8 0									
	Ba	eP eS PS eL M F	3	32	02					9230	N. et E. E. » N.	
				42	24							
				43	31							
				58								
			4	03	26	22	+440				Changement des feuilles.	
			après 6	45								
	PD	eP S eL M F	3	32	08					9820	N. N., int. min.	
				42	5(8)							
				55								
			4	08	42	25	+430					
			6	05								
	St	iP PR ₁ iS m PS L M ₁ M ₂	3	32	16					9730	Compression.	
				35	56							
				43	02							
					30	9	-62	-63				
					54							
				59								
			4	06	30	20	+380	+520	-300			
				11	00	20	+300					

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
17 Juin (suite)	St	M ₃			20	15		-380				
		M ₄	14	00		15-20		-495	-210			
		M ₅	15	00		15	-350					
		M ₆	19	00		20			+300			
		M ₇	24	30		15		-240				
		M ₈	25	30		14	+110					
		M ₉	27	00		15		+185				
		M ₁₀	29	00		14	+138	-147				
		M ₁₁	31	00		14	+128					
		M ₁₂	37	00		15		+170				
		F	dans le suivant.									
	Be	P	3	32	18							
		PR ₁		35	40							
		S		43	00							
		L		59								
		M	4	15-20								
	Al	F	6	50								
		P	3	32	20					9940		
		PR		35	31							
		S		43	15							
		L	4	01								
		M		06		23	310	380				
		M		12		20	220	230				
	Ma	M		18		16	120	150				
		M		36		16	50	50				
		F		55								
		eP	3	32	24					9740	E. N. et E. N.	
		eS		43	10							
	F après	eL	4	00								
		M		05	03	24		+350			Arrêt de l'appareil.	
17 »	St	P	7	00	41							
		F	8	40								La Paz eP 6 ^h 58 ^m 07 ^s
17 »	Pa	eP	7	00	44						Phases perdues dans le pré- cédent.	
	Pa	iP _r	22	33	39						Réplique	
17 »	Pa	L	23	05								
		M	10-11			19		3				St-Louis eP 22 ^h 26 ^m 15 ^s 2408 ^{km} La Paz eP 29 12 Sucre iP 29 37 5210
17 »	St	F	23,6								Compression.	
		P	22	83	54							
17-18 »	Pa	e(P?)		44								
		L	23	03								
17-18 »	Pa	F	dans le suivant.									
		iP	23	37	23					(9230)		
17-18 »	Pa	eS	(47	46)								
		L	0	07								
17-18 »	Pa	M	22-23			14-15	1	2				
		F	0,8									
17-18 »	St	P	23	37	38						Compression.	
		e(S?)		48								
17-18 »	St	L	0	03								
		F	1	00								
18 »	St	eL	16	27							Galitzine.	
		F		56							»	
18 »	Pa	eL	16	28								
		F		43								
18 »	St	eL	22	57							Galitzine.	
		F	23	23							»	
19 »	St	e(P?)	21	24	54					200 ?	Grand pendule.	
		i(P?)		55								
19 »	St	e ₁ (R ₁ P?)		25	01,5							
		e ₂ (R ₁₂ P?)		10								
19 »	St	e ₃ (R ₁₂ P?)		15								
		F		26								

Réplique
St-Louis iP 23^h 29^m 59^s
La Paz P 32 54 4635
Sucre iP 33 25 5035

Réplique ?
Cartuja Granada.
iP 15^h 52^m 48^s

Océanie ?
Manille eP 22^h 00^m 19^s 2940^{km}

Région Rhénane
Ressenti à Andernach près
Coblence.

Date	Sta tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
21 Juin	St	e ₁ e ₂ eL F	4	05	44						Galitzine.	Océanie
				09							"	
			5	50								Sydney 3 ^h 50 ^m 42 ^s
	Be	P	4	05	49						Pas d'autres phases.	
	Pa	iP L F	4	05	51							
			5	08								
			6,0									
21 "	St	P	11	00	(00)						Int. min.	
		L		30								
		M ₁	12	08	30	16			+12			
		M ₂		30	00	21			-18			Océanie
		M ₃		33	30	18		+12				région Iles Fidji
		M ₄		37	20	18	+13		+17			
		F	13	30								
	Pa	eP e(S) L	11	00	02							Sydney P 10 ^h 46 ^m 18 ^s
				15	41							Melbourne iP 47 35
				43								Kobe eP 51 18
		M ₁	12	09-10		23-22	6	11				Manille eP 51 20 7410 ^{km}
		M ₂		36-37		20-19	13	7				
		F	14,0									
	Be	eP	11	00	05						Pas d'autres phases.	
	Al	e ? L	11	00	42	6-7						
				08	17							
		M	12	01		30						
		M		18		24	14	14				
		M		24		24	28					
		M		30		22		28				
		M		34		19	16	13				
		F	13	30								
21 "	Pa	iP iS L	16	38	18					7650		Côte Sud d'Alaska
				47	20							
				58								
		M ₁	17	01-02		31		63				61° N 147° W
		M ₂		06-07		20-17	58	29				d'après
		M ₃		08-09		22-17	31	45				Victoria P 16 ^h 31 ^m 28 ^s 2100
		W ₂	18	59								Ottawa iP 16 35 24 4260
		F	20,7									Washington P 16 35 52 5220
	St	iP	16	38	22					7830	Compression.	
		m ₁			35	10			+13			
		P _c P			47							
		iPR ₁	41	00								
		m ₂			10	12			+16			
		PR ₂	43	04								
		PR ₃		47								
		iS	47	33								
		m ₃		45		15	+25	-28	+19			
		L		59								
		M ₁	17	08	30	17			-39			
		M ₂		09	00	20	-39					
		M ₃		30		15		+18				
		M ₄	10	00		20	+56					
		M ₅		45		15		-28				
		M ₆	11	00		15			+53			
		M ₇	12	00		15		-26				
		M ₈		30		14	+31		+54			
		M ₉		40		12		+24	+48			
		M ₁₀		30		14-12	-35		+35			
		M ₁₁		40		12		+22				
		M ₁₂		10		12			+27			
		F	20	50								
	Be	P	16	38	32							
		S		47	40							
		eL	17	00								
		F	18	40								

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ			
21 Juin (suite)	Gr	e(P)	16	38	49					8290	N. N. et E., int. min.	
		eS		48	1(3)							
		eL	17	00								
		F	18	10								
	Al	P	16	39	24					8950		
		PR		42	24							
		S		49	32							
		eL		57								
		M	17	13		19	20	17				
		M		19		17	40	13				
		M		24		17	30					
		M	19	03		19	13	7				
		F		50								
Ba	e	16	52							N. et E. »		
	eL	17	01									
	F		50									
24 »	St	iP	4	42	58						Compression. V. Galitzine. V. Galitzine, V. Galitzine. Galitzine.	Russie occidentale ? Buda-Pest P 4 ^h 42 ^m 09 ^s Vienne ePz 42 13 1150 Copenhague i 42 33 Zürich iP 42 55
		i ₁		43	25							
		i ₂			37							
		i ₃		44	52							
		e		53	(26)							
		L	5	09								
		F		30								
	Pa	e ₁	4	43	26							
		e ₂		43	52							
		e ₃		54,5								
		F	5,3									
	Be	eP	4	43	33						Pas d'autres phases.	
		Al	e	4	46	10						
eS?			54	13								
F	5		10									
25 »	Pa	eL	8	11							Côte de Chili 24° 7' S 71° 7' W d'après La Paz iP 7 ^h 22 ^m 04 ^s 678 km Sucre iP 22 18 710	
		F	8,6									
	St	eL	8	11								
		F		38								
26 »	Pa	traces	20	40-50						Vertical.	Alpes Carniques Innsbrück ePse 23 ^h 26,4 Trévise P 26 34 Zagreb P 26 38	
26 »	St	e ₁ (P?)	23	27	(51)				450	Grand pendule. P. int. min.		
		e ₂ (P?)		28	07							
		i(R ₂ P)			21							
		F		30								
27 »	St	eL	2	27						V. Galitzine. »	Océanie Manille ePne 1 ^h 33 ^m 00 540 ^{km} île Batam	
		F		39								
29-30 »	Pa	iP	23	09	21							Océanie Sud-Ouest des îles Fidji
		eS		27								
		L		51								
		M	0	06-07		31-23	78	45				
		F	2,2									
29-30 »	Be	e(P)	23	09	27					17000 ca.	Tracé défectueux. Dilatation.	d'après Apia P 22 ^h 53 ^m 40 ^s Sidney P 55 18 Honolulu iP 58 20 Batavia iP 23 00 17 D'après J. S. A. 172° E 18° S
		L		37								
		F	0	50								
	St	P	23	09	35							
		i ₁			58							
		i ₂		11	29							
		i ₃ (PR ₁)		12	47							
		e		19	(34)							
		L		30								
		M	0	11	30	20	+25	+19	-63			
		F	2	00								
	Al	e	23	10	24							
		S?		21	02							
		eL		54								
		M	0	13		30		20				

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
29-30 Juin (suite)	Al	M M F	15 19 1 15			30 22	30 20	12				
	Ba	e eL F	23 10 39 1 10								Faible. N.	
30 »	St	e F	23 36 38								Grand pendule.	
1 ^{er} juil.	Pa S	eL F	10 06 27								Vertical.	Inscrit par les stations amé- ricaines.
	St	eL F	10 09 35								V. et E. Galitzine.	
1 ^{er} »	St	e M F	16 58 17 00 05								Galitzine. N. Galitzine.	Italie Rocca di Papa eP 16 ^h 51 ^m 41 ^s Egalement inscrit par Min- eo, Naples, Valle di Pom- péi, Plaisance, Catane, Tarente, Trenta.
4 »	St	eL F	12 31 47								N. Galitzine.	Inscrit aussi par Kew
4 »	St	(eP) e eL F	18 03 22 06 30 40								V. Galitzine.	Rocca di Papa eP 18 ^h 02 ^m 36 ^s Emergences à Vienne, Car- tuja Granada, Kew.
4 »	St	eL F	22 29 51								H. Galitzine.	Pérou Région d'Ituata Réplique d'un précédent. La Paz iP 21 ^h 27 ^m 10 ^s 385km
	Pa	eL M ₁ M ₂ F	22 36 38-39 46-47 53			15 17	1	1				
5 »	Al	iP S m F	3 39 39 56 58 46				(15)	(6)		150		Algérie Région Cherchell à Orléans- ville.
	St	eL F	3 41 48								N. Galitzine. Galitzine.	
5 »	St	e F	23 16 18									Côtes de Dalmatie ? Données incomplètes.
6 »	Pa	traces	2 41-49								Vertical.	
7 »	Pa	e(P) L F	3 46 36 4 21 4,9									Mexique Côte sud, province de Mexico.
	St	e(P) e(S) eL F	3 46 51 57 49 4 23 56							10000	V. Galitzine. N. et E. Gal. faible. V. et E. Galitzine.	
7 »	St	eP eS eL F	18 12 44 23 (00) 42 19 21							9100	V. Galitzine. N. et E. Galitzine. E. Galitzine.	Japon Région Hokkaido Sumoto indique Cap Erimo
	Pa	eP eS L M F	18 12 52 23 (32) 47 54-55 19,2			18-16	3	2		(9600)		
	Al	LM	18 58			22					Traces.	
8 »	St	e eL F	12 09 12 40 57								V. Gal. faible. V. et E. Galitzine.	Amérique centrale — probablement réplique —

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
9 Juil.	St	P ⁷	21	42	52					15000 ?	V. Gal. et Wiechert. V. et E. Galitzine. N. et E. Galitzine. E. Gal. et Wiechert. V. et N. Galitzine.	Océan Pacifique Région îles Salomon Environ 10° S, 157° E
		i P ₁ P ₂ S ₂ ?		46	25							
		SR ₁ ?	22	09								
		eL		24								
				30								
		M ₁		37	47	18		-13				
	Pa	M ₂		42	35	20				(11700)		
		M ₃		49	32	20			+14			
		F	0	26					-15			
		eP	21	42	58							
		L	22	24								
		M		44-45		18-17	10	6				
10 »	Al	F	24,0							9850	V. Galitzine. E. Galitzine. Galitzine.	Pacifique au Sud du Mexique. 11° N, 101° W d'après St-Louis iP 2 ^h 08 ^m 04 ^s Ottawa iP 09 28 3700 ^{km} La Paz P 10 49 4670 Sucre P 11 12 5120
		P	21	43	25							
		S ²		55	35							
		L	22	34								
		M		48		25	10	3				
		M		52		21	8	6				
	Pa	F	23	40						2170	V. et N. Galitzine. E. Galitzine. Galitzine.	Asie mineure et Mer Egée Destructeur à Smyrne et Torballi. Ressenti île de Samos. 39° 0 N, 27° 7 E
		eP	2	15	(17)							
		L		46								
		M		53-54		21		6				
		F	3,6									
11 »	St	P	2	15	29					1910	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		eS		26	20							
		eL		47								
		M	2	56	04	18			+8			
		F	3	25								
	Pa	e ₁	3	10	32					2330		
		e ₂		28	55							
		eL	4	18								
		F	5	30								
13 »	Al	e ₁	3	10	37					2170	V. et N. Galitzine. E. Galitzine. Galitzine.	Asie mineure et Mer Egée Destructeur à Smyrne et Torballi. Ressenti île de Samos. 39° 0 N, 27° 7 E
		e ₂		15	21							
		L	4	21								
		M		43-44		16 17	2	2				
		F	5,2									
15 »	St	e ₁	9	55	(38)					1910	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		e ₂	10	10								
		eL		22								
				26								
		F	11	03								
	Pa	eL	10	13						2170	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		M		20		20	5	4				
		M		28		18	3	3				
		F	11	04								
15 »	Al	eL	10	24						2170	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		F	11,2									
	St	eP	9	37	57					2170	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		S		41	35							
		LM		46	20	12	1	1				
		M		51		11	1	1				
		F	10	31								
15 »	Pa	iP	9	37	41					2170	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		S		40	56							
				58								
		L		42	30							
		M ₁		43	59	11	-31					
		M ₂		45	04	11		+28				
15 »	Pa			05		10			+16	2170	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		M ₃			34	9	+22					
		F	10	30								
15 »	Al	eP	9	38	19					2170	V. et E. Galitzine. E. Galitzine. V. et N. Galitzine. E. et N. Galitzine.	Athènes iP 9 ^h 34 ^m 20 ^s 310 ^{km}
		iS		42	10							
		L		44,9								

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
15 Juil. (suite)	Pa	M F	45-46 10,3			13-14	16	8				
16 »	St	eL F	1 31 38								Galitzine.	Données insuffisantes —
	Al											De 0 ^h à 5 ^h , par instants, L irrégulières.
16 »	St	eL F	2 11 17								»	Quelques longues seule- ment —
17 »	St										N. et E. Galitzine.	traces de longues ondes en- tre 14 ^h 30 et 18 ^h
18 »	St	P e S? S F	9 23 37 53 59 24 35 28							460	E. Wiech. et Grand pendule. N. et E. Gd. pend. E. Wiech. E. Grand pendule et Wiech.	Italie Région de Bédonia, pro- vince de Parme ; panique parmi les habi- tants.
18 »	St	eP e F	11 28 51 29 1(1) 31,5								N. Galitzine et Wiechert. V. et E. Gal. int. min.	Italie réplique.
18 »	Ba	eP P i eS eL F	19 17 45 49 50 28 16 45 20 40							9410	E. N. E. » N. et E.	Pérou Destructeur à Chachapoyas
	Al	eP iP S eL M M M F	19 17 48 54 28 22 42 55 20 01 06 22 00			20 18 17	70 15	40 30 40		9470		6° 5 S, 79° 5 W d'après J. S. A. et U. S. C. and G. S.
	Pa	iP iS M L M ₁ M ₂ M ₃ F	19 17 56 28 30 28,5 29 42 45-46 50-51 57-58 23,4			10 9 40 29 19-19	26 138 28	29 77 45		9480		
	Ma	P eS eL F	19 18 04 28 36 46 21							9440		
	St	iP m PR ₁ S _c P _c S m S eL M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ F	19 18 (11) 23 21 52 28 54 56 29 25 42 56 54 59 20 04 56 05 19 08 42 13 12 23 20			7 6 19 20 17 17 16		+8 +8 +65 +48 -30 -31		10500	Int. min. Compression. V. E. Galitzine. V. Galitzine et Wiechert.	
	Gr	e ₁ e ₂ L F	19 22 32 40 20 38								E. pas des phases nettes.	
19 »	St	e ₁ e ₂ eL F	20 24 52 34 51 21 10								V. Galitzine, faible. E. Galitzine, faible. E. Galitzine.	Nord du Pérou réplique. La Paz P 19 ^h 38 ^m 33 ^s 2120 ^{km} Sucre eP 59 22 2290

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
19 Juil. (suite)	Pa	e L F	20	25	21						Vertical.	
				58								
			21	12								
19-20 »	Pa	e L M F	23	52	46							Océan Atlantique ? Données insuffisantes.
			0	28								
				37-38		20-19	4	2				
			1,4									
	St	e e(S) eL e? F	23	16	56						V. et N. Galitzine. E. Galitzine. » V. Galitzine, 2 ^e tr'. ?	Sucre iP 23 ^h 49 ^m 34 ^s La Paz iP 49 58
			0	05	46							
				29								
			1	29	52							
			2	25								
	Al	eS? LM M F	0	03	07							
				31		20		8				
				35		20	5	4				
				55								
20 »	St	e ₁ e ₂ eL F	18	37							V. Galitzine et Wiech. N. et E. Galitzine. Galitzine.	Trenta e 18 ^h 31 ^m 00 ^s Rocca di Papa 31 39 Zagreb eP 32 39
				37	36							
				39								
				47								
	Pa	traces	18	40-49								
20 »	St	S? S R ₂ S? F	19	55	0(9)						E. Grand pendule.	Italie ressenti à Bédonia province de Parme.
					39							
				56	07							
				59								
	Pa	e M F	19	56	54							
				57-58		8		0,5				
			20,0									
21 »	St	e eL F	2	58	56						V. Galitzine. »	Nord du Pérou La Paz iP 2 ^h 23 ^m 32 ^s 1790km
				40								
				17								
	Pa	e L F	2	59							Vertical.	
				46								
			4,1									
22 »	Pa	eP e(S) L F	7	40	49					(9300)		Côte du Mexique Fosse d'Acapulco
				51	12							
			8	15								
			8,8									
	St	eP e eL F	7	41	02						V. Galitzine. N. Galitzine. V. Galitzine.	St-Louis 7 ^h 34 ^m 18 ^s 2750km La Paz 36 17 5090
				51	51							
			8	16								
				45								
22 »	Al	eP iS F	19	30	55					25		Algérie
					58		(2)	(1)				
				31	30							
23 »	St	e ₁ e ₂ e ₃ e ₁ eL F	8	02	05						V. Galitzine. » N. Galitzine, int. min. V. Galitzine. »	Phases indistinctes.
				05	4(9)							
				16	1(5)							
				17	36							
			9	15								
				56								
23 »	Pa	e ₁ e ₂ L M F	8	02	12							
				06	06							
			9	14				1				
				19-20		18						
			9,8									
23 »	Pa	traces	16	10-14							Vertical.	Longues et émergences Algérie
24 »	Al	eP iS F	9	25	06					25		
					09							
					30							

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
25 Juil.	St	e_1 e_2 F	1	26	11 28						E. Grand pendule. »	Padoue 1 ^h 25 ^m 33 ^s 130 ^{km}
26 »	St	eL F	13	19	45						V. Galitzine.	Batavia iP 12 ^h 18 ^m 25 ^s Scamba
	Pa	eL F	13	26	39							
27 »	Pa	eL F	16	17	16,9						Vertical.	Océanie Phù Lien 15 ^h 27 ^m 06 ^s 2070 ^{km}
	St	eL F	16	32	17 19						V. Galitzine.	
28 »	Pa	eL M F	20	43	49-50 21,1	20-19	2	2				Amérique du Nord Sucre P 19 ^h 53 ^m 27 ^s La Paz 53 50 31° 9 N 75° W
	St	eL F	21	(03)	30						V. Galitzine, pendule ar- rêtée.	
29 »	St	e i F	18	23	07 21						E. Galitzine. N. Galitzine.	Belgrade eP 18 ^h 17 ^m 19,2 ^s 370 ^k Zag. eb eP (18)?
	Pa	e F	18	25	31 33						Vertical.	
30 »	St	e_1 e_2 eL F	2	56	3 08 23 4 18						V. et E. Galitzine. V. Galitzine. »	Inscrit par les stations des Etats Unis et par La Paz 2 ^h 50 ^m 36 ^s 5900 Sucre 51 ^m 05 6380
	Pa	eL M F	3	20	28-29 4,1	19-19	2	3				
31 »	St	eL F	20	16	43						E. Galitzine.	Longues dans les diverses stations. Un séisme au Japon. Kobe P. 19 ^h 30 ^m 33 ^s Est de Myako, préfecture d'Iwate.
	Pa	eL F	20	21	20,7						Vertical.	
1 ^{er} août	Pa	eL F	17	04	11							
1 ^{er} »	Pa	eL F	17	57	20 10							Région Pyrénées
1 ^{er} »	Ba	$\overline{P}$ $i\overline{S}$ F	18	49	34 37 50					10		
1 ^{er} »	Pa	traces	19	15-19							Vertical.	
1 ^{er} »	St	e_1 e_2 e_3 F	19	51	12 20 00 41 21 19						V. Galitzine. V. E. Galitzine. »	Zi-Ka-Wei P _Z 19 ^h 33 ^m 05 ^s 2480 ^k
	Pa	eL F	20	56	21 10							
2 »	St	eL F	7	23	8 00						Galitzine. Galitzine.	Inscrit par les stations amé- ricaines. Washington eP 6 ^h 51 ^m 44 ^s Frioul
2 »	St	$R_2\overline{P}$ $\overline{S}$ $\overline{S}$ F	8	44	00 30 38 47					560	E. Grand pendule et Wiech. Grand pendule. » Grand pendule et Galitzine.	Zagreb iP 8 ^h 42 ^m (48) Coire eP _N 42 49,9 252 ^{km} Zürich iP _N 42 59 340 d'après Zürich. 46°,20 N. 13° E.
	Be	traces F	8	44	45							

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km.	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
2 Août	Ba	iP F	17	46	45						Lôcal.	Pyrénées
3 »	St	e eL F	7	20	(02)						Int. min. V. E. Galitzine.	Atlantique?
				30							»	Peut être secousse prémo-
			8	00							»	nitoire.
	Al	eL M F	7	20		15	2	2				Sucre cP 7h 12m 01s La Paz cP 12 29 5600km
3 »	Pa	eL M F	7	28		13-12	1	1				
				32 33								
				45								
	Al	P PR S?	11	52	38					(4550)		
				54	19							
				58	55							
		L	12	02								Atlantique
		M		08		13	14	12				
		M		10		10	15	11				Est du Rocher St-Paul Région de Daussey.
	Pa	iP eS	11	54	04					5820		
			12	01	30							
		L		11								Environ 0° et 16° W.
3 »		M ₁		11-12		23-23	7	8				
		M ₂		15-16		12-15	3	6				
		M ₃		16-17		13-12	6	4				
		F	13,2									
	St	iP S	11	54	12					6000		
			12	01	46							
		eL		12								
		M		16	47	13		+9				
		F	13	25								
	Be	eL F	12	12								
				27								
	St	e F	23	12								Italie
3 »				15								Alpes Apuanes
	Pa	e L	23	56								Casola, Lunigiana,
			0	02								Fivizzano, Camaione V.
		M F		02 03		9-10	2	2				
4 »				0,3								
	Be	e i F	4	21	(09)						Int. min.	Italie
				22	01							Ligurie du Nord.
				25								
	St	e ₁ e ₂ i ₁ i ₂ F	4	21	40							Bedonia, VI-VII, S. Stefano
					59							d'Aveto, VI, Levanto V,
				22	16							Bardi IV-V etc...
					44							
				29								vers 44° 5 N, 8° 5 E.
	Pa	eP eS L	4	23	(09)					(440)		
				23	(58)							
		M F		25								
4 »			24,5-25			7		2				
			28									
	Pa	iP PR	18	38	57					9250		Mexique
				42	16							Destructeur dans la pro-
		iS		49	20							vince de Oaxaca.
		L	19	06								
		M ₁		14-15		21-22	72	270				
		M ₂		17-18		21-19	95	262				16° N 98° W (Strasbourg)
		M ₃		19-20		20-18	96	117				14° N 98° W (USCGS)
		F	23,1									
	Ba	eP ePR ₁ eS ePS L	18	38	57							
				42	19							
				49	25							
				50	23							
			19	05								

Seismologica
Centre

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
10 Août	St	iP iPR ₁ iPR ₂ PR ₃ e ₁ e ₂ eL F	15	41	57 43 02 43 50 44 57 48 32 52 22 53 16 30				5500		Turkestan. Région Pamir. Phu-Lien iP 15 ^h 40 ^m 18 ^s	
	Be	eP F	15	42	05 47					Int. min.		
10 »	Pa	i(P) e L F	15	42	20 48 55 16,4							
	Al	P eS? LM F	15	42	46 49 42 58 30 16 05	8	1					
12 »	St	e i eL F	8	23	32 27 9 06 10 40					V. Galitzine.		
	Pa	e L M ₁ M ₂ F	8	26	54 37 38-39 9 14-15 9,9	17 13-19	2	5 4			Océanie-Célèbes. vers 2° N. 126° E. ressenti aux îles Sanger. Menado, Ternate.	
12 »	St	eL F	20	17	33					E. Galitzine. »	Néant	
15 »	St	eP eS eL F	12	00	00 03 45 07 28				2260	Galitzine. » » »	Données insuffisantes: les autres stations ne semblent pas avoir inscrit de P.	
	Pa	eL F	12	14	53 30					Vertical.		
15 »	St	P eS eL F	15	46	30 52 45 58 16 36				4500		Atlantique vers 30° N. 44° W.	
	Pa	e L M F	15	46	56 57 58 16,6	11	1				Granada 15 ^h 45 ^m 15 ^s Kew 45 54 Strasbourg 46 30	
15 »	Al	P PR eS L M M F	17	27	38 29 47 37 37 47 51 52 18 20	25 22	6	10			Argentine La Plata iP 17 17,6 ^m Sucre iP 17 17 55 890 ^{km} La Paz iP 17 18 32 1200	
	St	e (ePR ₃ ?) eL F	17	21	57 39 (00) 53 19 30						d'après La Paz et Sucre. 26° 8 S 64° 6 W.	
	Pa	eP eS L M F	17	28	11 37 44 43 18 09-10 18,7	9-9 20-18	4 6	6 3				
16 »	St	e eL F	8	02	07 35					V. Galitzine. Galitzine. »	Inscrit par un très petit nombre de stations.	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicertrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
16 Août (suite)	Pa	eL F	8	06							Vertical.	
19 »	St	eP eL F	2 55 3 00 4 35	24							V. Galitzine. Galitzine »	Données incompatibles Kew 2h 24m 28s 2100 Uccle 2 55,0 2400
	Pa	e L F	2 55 58 3,3									
20 »	Pa	traces F	2 47 3 10								Vertical.	
	St	eL F	2 50 3 11								V. Galitzine. »	Longues seulement.
20 »	Pa	traces	18 38-52								Vertical.	
	St	eL F	18 41 51								V. Galitzine »	St-Louis iP 17h 55m,5 $\Delta=24,08$
21 »	St	eL F	19 27 37								V. Galitzine. »	
	Pa	traces	19 29-45								Vertical.	
21 »	Ba	iP F	23 40 11 41 30							local		Ressenti dans les Hautes- Pyrénées.
	St	e F	23 44 29 47								Grand pendule, pas de pha- ses nettes.	
22 »	Be	P i F	0 04 44 48 06									Suisse Ressenti dans le canton de Vaud à Orbe. 43°43' N. 6°38' E. Zürich iP 0h 04m 58s,0 167km Coire iP 0 05 07,2 224 D'après ces deux stations Zürich place l'épicentre dans le triangle : Orbe, Chavornay, Arnex. Zürich iP 1h 28m 44,8
	St	e F	0 05 33 08								Grand pendule, pas de pha- ses nettes.	
23 »	St	e(P?) e(PR?) e(S?) F	1 28 43 30 45 37 39 50								V. Galitzine. » E. Galitzine.	
23 »	St	eP eS L F	4 12 01 19 05 24 45							4300		Perse? Ressenti en Perse
	Pa	eL M F	4 13 24-25 40			12-11	2	2				
23 »	St	e(P?) e(S?) eL F	6 21 13 25 29 31 40								V. Galitzine. V. E. Galitzine. Galitzine. »	
24 »	Al	iP S R M F	9 44 55 45 28 37 46 20 10 20				(140) (170)	(110) (120)		240		Algérie Des dommages dans la ré- gion Inkermann.
	Ba	eP eS L M F	9 46 28 47 40 49 30 10 00			9	12	24		660		
	Pa	e L M ₁ M ₂ F	9 47 31 51 51-52 52-53 10,6			25-16 11-9	30 18s	20 12				

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
24 Août	St	eP e(S) L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M _{5F}	9	47	45 30 52 10 10 55 30 30	15 9 8 8-7 6-7		+25	+7 -12 +6	1550		
	Gr	eL M F	9	48	50 06	9		26				
	Be	eL F	9	51	05							
24 »	Al	e S R ₁ S F	10	28	48 29 21 33		(3)	(2)				Réplique Algérie
24 »	Al	e S F	12	18	40 19 21		(1)	(1)				Algérie Réplique
24 »	St	iP i ₁ i ₂ i ₃ L F	22	02	41 03 05 06 16 00						Compression. V. Galitzine. V. E. Galitzine. V. Galitzine.	Séismes superposés. Réplique en Algérie. En Italie ressenti à Frosi- none, Montecassino II.
	Al	e S F	22	02	43 03 12		(1)	(1)				Padoue eP 22h 02m 23s 250km
	Pa	e L M F	22	02	48 13 15-16 23,2	7-14	3	2				
	Be	P F	22	02	49 10							
24 »	Ba	P i ₁ i ₂ F	22	02	(59) 03 17 58 18						Int. min.	
25 »	Pa	traces	0	28-52							Vertical.	
25 »	St	eP S L F	21	11	03 12 23 50 25					730		Yougo-Slavie Ressenti à Zagreb. iP 21h 09m 11s,8 40km
	Be	eP eS F	21	11	(12) 12 59 18						Int. min.	Uskôcke Gore 45° 50' N. 15° 40' E
	Gr	e F	21	12	21							
	Pa	eL F	21	14	24							
26 »	St	e i L F	4	21	48 5 16 28 17 00						V. Galitzine. Nouvelle secousse?	Apia P. 4h 03m 17s
	Pa	traces	5	16-50							Vertical.	
28 »	St	e F	1	46	58						Galitzine.	Belgrade eP 1h 41m 9s,4 750 Zagreb P 41 52 750

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_2 μ			
28 Août	Pa	traces	9	36-53							Vertical.	La Paz P 8 ^h 43 ^m 28 ^s
29 »	Pa	traces	4	00-25							Vertical.	
29 »	St	eL F	10	50 59							V. Galitzine. »	
29 »	Al	eP S F	12	27 46 28 01 30		(1)	(1)					Algérie Région Port de Gueydon.
29 »	St	e L F	17 38 18 03 35								E. Galitzine. V. E. Galitzine. »	Manille eP 17 ^h 19 ^m 02 Zi-Ka-Wei P 19 51 310 ^{km}
30 »	Pa	traces	18	09-28							Vertical.	
30 »	St	iP i eS L F	6 43 54 50 36 54 38 7 21 8 00							9700	V. Galitzine. Galitzine. E. Galitzine. Galitzine.	Région Formose Taihoku P 6 ^h 31 ^m 42 ^s Manille eP 33 07 Zi-Ka-Wei P 33 11 580 ^{km}
30 »	Pa	e L M F	7 18 25 29-30 7,8		18-18	3	3					Réplique Taihoku P 10 ^h 54 ^m 58 ^s Zi-Ka-Wei e 58 07 Manille eP 58 26
30 »	St	traces F	11 42 52								V. E. Galitzine. »	Zi-Ka-Wei eP 12 07 27 2590 ^{km}
30 »	St	L F	12 52 13 15								Galitzine.	
30 »	Pa	traces	12	56-13 ^h 05							Vertical.	
30 »	Ba	iP F	19 02 14 03							local		Pyrénées Ressenti à Bagnères de Bigorre. Balingier Alp d'après Zürich
30 »	St	iP iS F	20 11 07 21 14							100		48° 12'N. 8° 57'E
30 »	Be	eP F	20 12 04 12,4									Inscrit par les stations amé- ricaines.
30 »	St	L F	22 49 23 11								V. Galitzine. »	Atlantique
31 »	St	e eL F	5 24 32 6 20								V. Galitzine. V. et E. Galitzine.	Sucre 5 ^h 22 ^m 06 4260 ^{km} La Paz iP 22 09 4390 Granada iP 22 30
1 ^{er} sept.	Pa	traces F	5 31 6 04									Asie
1 ^{er} sept.	St	e(P) e(S?) e(SR,?) L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	6 16 00 25 29 34 45 20 47 10 48 15 53 20 10 ca		15-14 14 12 12		+21 +15 -9	+13 +9 -7			Int. min. V. E. Galitzine. N. S. irrégulier.	Région Himalaya. Phu Lien 6 ^h 15 ^m 51 ^s 3690 ^{km} Lemberg 15 42 Zi-Ka-Wei 17 20
1 ^{er} sept.	Be	e(P) S _N L F	6 18 15 25 35 36 7 25								Phases faibles et douteuses	
1 ^{er} sept.	Pa	eP eS L M ₁ M ₂ M ₃ F	6 18 27 26 09 39 30-31 32-33 36-37 8,1		26-18 21-26 18-13	23 12 19	7 22 17			6140		

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
1 ^{er} Sept. (suite)	Al	e S L M ₁ M ₂ F	6	18	41 26 34 47 51	20 14	4 2	2				
2 »	Pa	e(P) eS L M ₁ M ₂ F	0	06	31 16 34 38-39 42-43	13-18 23	2	3 6		9230	Changement des feuilles.	Amérique centrale
	St	eP eS L M F	0	06	43 17 27 47 30 1 40	17		+6 +6		9450	V. E. Galitzine. E. Galitzine.	St-Louis eP 23 ^h 59 ^m 125.1 Washington eP 0 00 La Paz iP 01 45 4065 Sucre iP 02 7 5145
2 »	Pa	e L F	17	16	46 18 18 19,1						V. Galitzine.	Océan Pacifique
	St	e(P?) L F	17	16	48 18 00 19 10						V. Galitzine. »	Apia e 16 ^h 56 ^m 52 ^s Zi-Ka-Wei e 17 08 56
3 »	St	traces	6	00-50							V. Galitzine.	Sud Atlantique
	Pa	»	6	08-48							Vertical.	
5 »	Pa	traces	3	25-42							Vertical.	Cartuja iP 6 ^h 07 ^m 03 9450km La Paz iP 5 50 06 5670 Sucre iP 5 49 34 5690
6 »	St	eL F	7	11	57						V. E. Galitzine: »	
	Pa	eL M F	7	13	23 7,6	18-18	4	3				Japon?
6 »	Pa	e L F	9	10	56 10 15 10,8						Vertical.	Pacifique
	St	e(P) L F	9	11	(00) 10 25 45						Int. min. V. Galitzine. »	Apia P 8 ^h 52 ^m 00 2 ^o
7 »	St	e(P) e(S?) L F	3	09	(00) 20 47 5 00						Int. min. V. Galitzine. V. E. Galitzine. » »	Océanie Région S. E. Philippines. Manille P _{NE} 2 ^h 54 ^m 28 ^s Malabar P 56 45 Honolulu 59 30
9 »	Al	P S F	23	30	15 30 27 32		5	5		100		Algérie Région de Tizirt.
11 »	St	PR ₂ ? PR ₃ ? c L F	0	56	13 58 13 1 08 30 2 25					11700?	V. Galitzine. » V. E. Galitzine. » »	Océanie Nagasaki P 0 45 ^m 12 ^s Phu-Lien iP 0 46 20 Sydney P 0 47 30
	Pa	eP? L M F	0	58	26 1 43 53-54 2,3	21-20	5	3				
11 »	Al	eP S L M ₁ M ₂ F	12	19	21 13 00 23 25 30 30 30 47	20 16	8 6	8 6		9850		Nord Océan Pacifique au large de la Californie. 42° N. 131° 5 W

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ			
1 sept. (suite)	Pa	eP	12	48	29	18-18	15	12		9450	N.	Victoria P _{EN} 12h37m48s 740km Berkeley iP _{NE} 38 24 1020 Sitka iP _N 39 39
	iS		58	26								
	L	13	08									
	M	13	20									
	F	14,6										
	St	eP	12	48	29	15	+15	+16	9130	V. Galitzine. E. Galitzine.		
	eS		58	51								
	eL	13	08									
	M ₁		26	15								
	M ₂		29	00								
	M ₃		35	30	13	-7	-6					
	F	15	40									
	PD	e(?)	13	11		20	4					
	L		24									
	F		40									
	Be	eL	13	18								
	F		50									
1 "	Pa	eL	18	40							Vertical.	
F		48										
	St	eL	18	42							V. E. Galitzine.	
F		53										
2 "	Pa	eP	1	38	51					18000	Dilatation V. Gal. V. N. Galitzine. V. Galitzine. H. Galitzine. V. Galitzine.	Océanie Sud Pacifique Région nord de la Nouvelle Zélande. Honolulu eP 1h 28m 42s Batavia P 29 33 Manille eP 30 40
L		57										
F	3,3											
St	iP'	1	39	15								
i ₁			57									
PR ₁			43	38	20	4						
PR ₂			49	47								
L	2	00										
F	3	30										
Al	S	1	50	45								
	LM	2	10		22		5					
	F	3	00									
St	e(P)	3	40	43								
e(PR?)			45									
e(S?)			51	22								
L	4	08			25-31 23-22	5	12	7	9580	V. Galitzine. V. E. Galitzine. E. Galitzine.	Célèbes S. E. I. Sangir, Menado, Halmakeira. Manille eP _{NE} 3h 29m 37s 2280 Batavia iP _E 31 10 2450 Nagasaki eP 31 31,53451	
F	7	00										
Al	S	3	52	51								
eL	4	14										
M		42										
	F		50		25-31 23-22	5	12	7		V. E. Galitzine. Vertical.	Océan Atlantique	
Pa	e(P)	3	41	19								
(PR)			45	29								
e(S)			54	59								
L	4	21										
M ₁		28-29			10-13	1	1		5510	V. Galitzine. H. Galitzine. " "	Italie?	
M ₂		34-35										
F	5,4											
St	e	19	11-23									
Pa	traces	19	17-20									
14 "	Pa	iP _v	8	10	13							Cartuja iP 8h 09m 31s 4350km St-Louis iE 10 00 La Paz P 10 18 Kew eP 10 23
L		23										
M		24-25										
F	8,8											
St	eP	8	10	53								
	eS		18	03								
L			25									
F	9	04										
St	e	3	02									
eL			04									
	F		12									

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
18 sept.	Al	cP	17	27	21					5000		Atlantique (Rocher St-Paul) 26° W. 5° N. Granada iP 17 ^h 26 ^m 57 ^s Alger eP 17 27 21 La Paz P 17 28 22
		PR		29	12							
		S		34	03							
		L		40								
		M ₁		42	40	15	18					
		M ₂		45		11		35				
		M ₃		47		11	20	20				
		M ₄		49		11	25	21				
		M ₅		52	30	9	15					
		M ₆		56	30	11	16	15				
		F	19	10								
	PD	iP _N	17	27	27					6000		
		iS		36	00							
		L		45								
		F	18	30								
	Gr	e(P) _E	17	28						6350		
		e(S)	17	56								
		L		41								
		F	18	55								
	Pa	eP	17	28	43					6000		
		iS		36	19							
		L		45								
		M ₁		45-46		31		32				
		M ₂		53-54		14-13	33	16				
		F	19,3									
	St	eP	17	28	44					6350		
		ePR ₂		32	23							
		eS		36	39							
		ePS		37	06							
		eSR ₁		40	29							
		eSR ₂		42	42							
		eSR ₃		43	26							
		L	17	44								
		M ₁		52	00	14		+25				
		M ₂			40	13			+16			
		M ₃		53	40	12		-23				
		M ₄		55	00	12			+28			
		M ₅			20	14	+13					
		M ₆			30	10		+14				
		M ₇		57	30	10			-15			
		M ₈		58	45	12		+22				
		M ₉		59	45	11-10	-10		+15			
		M ₁₀	18	02	50	11	+12	-11	-14			
		M ₁₁		05	20	11			+16			
		F	19	30								
	Be	eP	17	28	(54)					6350		
		eS		36	20							
		L		44								
		F	18	30								
18	Al	P	20	01	28					5750		Océan Indien Helwan P 19 ^h 58 ^m 00 ^s 2890 Tananarive eP 19 59 10 3690 Phu-Lien eP 20 01 53 5550 51° E. 13° N.
		S		08	29							
		eL		16								
		M ₁		20		22	13	12				
		M ₂		25		12	4	6				
		F	21	00								
	St	P	20	01	34					5750	Compression.	
		ePR ₁		03	42							
		ePR ₃		05	03							
		eS		08	(57)						Int. mln.	
		eSR ₁		12	45							
		L		20								
	Be	F	21	40						5920		
		eP	20	01	(37)							
		eS		08	50							
		eL		20								
	Pa	F	20	45								
		eP	20	01	59							
		eS		09	31							

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_z μ			
18 sept. (suite)	Pa	L M ₁ M ₂ F	20 18 20-21 30-31 21,5			30 15		12	5			
19 "	St	e(P?) i(PR?) e(S?) e(PS?) L F	8 28 52 32 37 40 41 9 00 20								V. Galitzine. " E. Galitzine. V. E. Galitzine. "	Japon S. SW. des îles Hatidga. Kobe eP _N 8 ^h 17 ^m 54 ^s Taihoku P 19 50 Manille eP 21 00
21 "	Pa	traces	9 31-49									
21 "	Pa	e L F	13 39 42 14 12 14,6									
	St	eP i eS? L F	13 40 48 43 41 51 (56) 14 00 30							10230?	V. Galitzine. Galitzine. " "	Côte du Pérou et du Chili La Paz iP 13 ^h 27 ^m 57 ^s 310 ^{km} Sucre iP 28 39 575 18° S. 71° W. d'après ces stations.
22 "	Pa	eP L F	6 15 18 7 18 7,6								Vertical.	
	St	i(P) F	6 15 57 dans le suivant.								Dilatation. V. Galitzine, pas de S.	Océanie Apia i 5 ^h 56 ^m 44 ^s
22 "	St	iP i(PR?) L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ F	7 50 42 53 41 8 12 50 05 55 30 56 30 57 40 9 00 30 03 50 08 00 24 00 11 00			22 22 22 18 18-16 18-16 16 16	+20 +20 +30	+20 +30 +25 -21 +26 +16 -14	+20 +30 +25 -21 +26 +16 -16		Dilatation. V. Galitzine, pas de S.	Océanie Entre les Nouvelles Hébrides et les îles Salomon. 14°S 164°E d'après U.S.C.G et J.S.A.
	Pa	eP PR L M ₁ M ₂ F	7 50 50 54 00 8 22 56-57 57-58 11,0			20 20-18	35	29 18				Apia P 7 ^h 36 ^m 22 ^s Honolulu iP 40 09 Manille eP _{NE} 40 37 5195
	Al	P eS? eL M ₁ M ₂ M ₃ F	7 51 24 8 05 12 39 49 9 05 10 52			32 20 18	25 12 10	15		(15000)		
	Be	e _N eL F	7 53 59 8 45 9 25									
22 "	Pa	e L F	22 14 41 23 17 23,6								Vertical.	Inscrit aussi par Washing- ton.
23 "	Pa	eL F	14 24 40									Données incomplètes
	St	eL F	14 25 50								V. E. Galitzine.	
24 "	St	e(P?) e e(S?) eL F	8 58 9 01 06 10 06 45								V. E. Galitzine. N. Galitzine. H. Galitzine. V. Galitzine. Galitzine.	Tucson P _N 8 ^h 32 ^m 35 ^s

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicroentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
24 sept. (suite)	Pa	eL F	10	17	38							
25 "	St	eP ePR ₁ eS eL F	5	11	04 14 24 21 26 38 6 00					9230	V. Galitzine. " H. Galitzine. Galitzine. "	Japon Kobe iP _E 4 ^h 59 ^m 12,7 ^s 358 Nagasaki P 4 59 ^m 25 356
	Pa	traces	5	34	à 6 ^h 00							
25 "	St	iP PR ₁ S iPS L F	8	14	55 18 04 25 13 53 40 10 00					9150	Vertical. Dilatation V. Galitzine. V. Galitzine. H. Galitzine. V. Galitzine.	Suwo Nada partie ouest de la mer intérieure. Japon Kobe 8 06 42 1970 SE Hokkaido 42° N. 149° E.
25 "	Pa	iP eS L M F	8	15	02 25 20 46 9 00 9,7	5-5 16-16	2 4	2 3				
25 "	St	e ₁ e ₂ L F	19	06	09 12 24						V. N. Galitzine. Galitzine. "	Zagreb e 19 ^h 04 ^m 33 ^s Coire eP 05 05,3
	Pa	e L F	19	10	15 19,8							
26 "	Al	P S RPS F	8	56	03 56 14 19 59		(6)	(6)		90		Algérie
27 "	Al	P S L M F	0	54	25 1 02 43 12 23 34	13	1					Petites Antilles Ile de la Barbade ressentit dans l'île. 12° N. 59° W. d'après U.S.C.G.S. et J.S.A. plus au Nord que l'île.
	Pa	eP eS L M F	0	54	36 1 02 59 14 16 2,0	19-20	3	7				
	St	iP S iPS L F	0	54	55 1 03 51 04 26 15 2 30					7530	Dilatation. H. Galitzine. E. Galitzine.	
1 ^{er} Oct.	St	traces	13	32-50							E. V. Galitzine.	
	Pa	eL F	14	42	53						Vertical.	
2 "	St	e i F	14	24	25 34 31						V. Galitzine. Galitzine. "	
	Be	e F	14	25,1	26,3							
3 "	St	e ₁ e ₂ L F	1	01	05 30 08 35						V. E. Galitzine. " Galitzine. "	
	Pa	eL M ₁ M ₂ F	1	10	11-12 13-14 18	11 12-10	2 1	1				

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
4 octob.	St	e(P?) e(PR?) L F	11	19	22						V. Galitzine. Galitzine. Galitzine. »	
			11	26	49							
	Pa	e L M F	11	23	30						E.	
			27 28-29			13-13	4	2				
4 "	Gr	eP e(S?) eL F	18	31	16						Compression. int. minutes.	Abyssinie 6° N. 35,5 E.
			34 49	21								
	St	P PR ₁ eS iPS SR ₁ L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	18	31	42					5450	Helwan P 18 ^h 28 ^m 11 ^s Tananarive P 28 50 Bombay eP 30 19	
			33 38 39 (00) 42 45 58 06 19 01 03 12 11 02 00 20 00			10 12 11 9		+5 +7	+5 +6			
	Be	eP PR ₁ S L M F	18	31	52						N. E.	
			33 38 46 52-55									
	Pa	eP eS L M F	18	32	06						150	Algérie Région de Ténès.
			39 (11) 50 53-54 19,8			19-18	12	10				
	Ba	e L F	18	35	40							
			19 07 20 30									
	Al	eS eL M M M M F	18	40	44							
			46 47 48 51 30 33 19 10			9 14 10 9	20 8 14	12 15 10 7				
6 "	Al	eP S F	1	24	16							
			24 25	35			(1)	(1)				
9 "	LM	P S L M ₁ M ₂ M ₃	3	13	00							
			23 39 46 30 54 30 57 30	40				83 62 62 41				
9 "	Ba	iP PR ₁ S L M F	3	13	48						200	
			16 24 40 44 16 5 10	54 39								
	Gr	eP PR ₁ e(?) iS L M ₁	3	13	50						int. minutes.	Mexique Fosse d'Acapulco. Destruc- teur dans la province d'Oaxaca. 15°N 97°W d'après U.S.C.G.S
			17 20 (00) 23 18 37 47 18	31		26		529				

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
9 octob. (suite)	Gr	M ₂	3	49	33	21						14° 7N 97° 5W d'après J.S.A.
		M ₃		57	04	15		479				
		F	6	20				143				
	Pa	iP	3	13	42							
		PR		17	05					9450		
		iS		24	15	11-19	56	250				
		L		38								
		M ₁		45-46		25-25	220	170				
		M ₂		47-48		20-26	150	660				
		M ₃		48-49		23-21	200	660				
		M ₄		54-55		21-19	140	260				
		M ₅		58-59		18-19	100	300				
		F	7,5									
	St	iP	3	13	59					9650	Compression.	
		iPR ₁		17	25							
		iS		24	41							
		iPS		25	45							
		m		26	00	15			-50			
		SR ₁		30	51							
		SR ₃		36	32							
		L		40								
		M ₁		45	30	15	+90					
		M ₂		48	00	18		+290				
		M ₃		50	00	15			>190			
		M ₄		51	00	18		+400				
		M ₅		52	30	18-15	-340		>190			
		M ₆		53	30	18	-210	+520				
		M ₇		56	30	15			>190			
		M ₈		57	00	18		-340				
		M ₉		58	30	15			+200			
		M ₁₀		59	10	15			+200			
		M ₁₁		59	10	15		-290				
		M ₁₂	4	01	00	18	350					
		M ₁₃		05	30	15	+79					
		F	7	30								
	Be	iP	3	14	01							
		PR ₁		17	21							
		iS		24	24							
		PS		25	35							
		L		38								
		M		48-58								
		F	5	30								
	Al	P	3	14	02					9550		
		S		24	39							
		m		26		8	10	30				
		L	3	42								
		M		47		24	110	190				
		M		51	30	20	65	220				
		M		53	30	19		250				
		M		56		18	60					
		M		59	30	16		55				
		F	4	03		15	55	45				
		F	6	40								
	Ma	iP	3	14	21							
		PR ₁		18	09							
		iS		25	09							
		iPS		26	10							
		L		40								
		F	7									
	PD	i(PR ₂ ?)	3	19	25							
		i		28	23							
		i(SR ₁ ?)		29	21							
		L		45								
		F		vers 5 ^h								
9	Al	cP	8	45	58					90		Algérie
		S		46	09	(1)	(1)					
		F		47								
9	St	i	14	56	28					V. Galitzine.		Melbourne i 14 ^h 47 ^m 32 ^s
		F	15	00						Galitzine.		

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
9 octob.	Al	eP S F	17	51	12		(2)	(3)		90		Algérie
				51	23							
				52	20							
10 "	Pa	traces	21	43-53								Pacifique
	St	eL F	21	43							V. Galitzine.	Kobe eP 20 ^h 41 ^m 45 ^s
			22	06							"	Manille eP 41 53
												Melbourne i 52 33
11 "	Pa	e L F	0	29								
				39								
			0,9									
12 "	St	eL F	0	25								St Louis i 23 56 51
			1	00								Victoria P 0 06 01
12 "	St	i(P?)	7	41	53						Compression. V. Gal. Changement des feuilles.	D'après Phû-Lien deux séis- mes superposés.
		eL F	8	10								Hukuoka eP 7 31 57 4900 mer d'Okhotsk.
			9	10								
	Pa	e L M F	7	42	03	13-13	4	3				
			8	15								
				25-26								
			9,2									
	Gr	eP L F	7	42	20							
			8	03								
				50								
13 "	St	eL F	13	54							Galitzine.	St-Louis e 13 ^h 13 ^m 36 ^s
			14	11							"	Tucson P 13 18
												longues ailleurs.
13 "	St	e eL F	15	37							V. Galitzine. V. et E. Galitzine.	Océanie S. E. de Mindanao.
				46							"	Région île Sangir, presque île
			16	45								
	Pa	eL M F	16	20		21		4				Manille eP 15 20 40 Phû-Lien eP 22 47 2900
				23-24								
			16,6									
15 "	St	e L F	8	52							V. E. Galitzine.	Océanie
			9	08							"	0° N 137° E
			11	08							"	Manille eP 8 ^h 38 ^m 19 ^s
	Pa	e L M F	8	53	19	20-21	6	5				Kobe P 40 18
			9	39								Sydney 40 42
				48								
			10,7									
15 "	St	iP iPR ₁ PR ₂ eS iSR ₁ m L M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ M ₅ M ₆ M ₇ M ₈ M ₉ M ₁₀ F	14	28	30					5450	Compression.	
				30	27							
				31	23							
				35	37							
				39	39							
				40	00	16		+30				Côte Beloutchistan. vers 28° N. 66° E.
				43								
				47	30	7	+7					Helwan iP 14 ^h 26 ^m 03 ^s
				50	40	15		+42				Bombay P 22 14
				51	30	15		+44				Calcutta 24 16
				52	40	15		-50				
				53	50	15			+35			
				55	00	15			-23			
				55	50	15		+88				
				56	40	15			+54			
				58	10	12			+25			
				59	30	8	-8					
			17	30								
	Be	iP eS SR ₁ L F	14	28	39							
				35	46							
				40	05							
				47								
			15	30								
	Pa	iP e(S)	14	28	59					5820		
				36	25							

Date	Sta tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
15 octob. (suite)	Pa	L M ₁ M ₂ F	49 53-54 58-59 16,0			23-18 15-19	61 29	41 78				
	Al	P S L M M F	14 29 02 36 35 43 55 15 00 40			17 16	12 7	8		5950		
17 »	St	eL F	7 10 8 10								V. Galitzine perturbé par le changement des feuilles. V. Galitzine.	
17 »	St	e eL F	15 39 16 14 18 00									Sud Amérique
17 »	Al	L M M F	16 15 19 23 40			20 20	9 18	9			forte agitation.	îles Falkland
	Pa	eL M F	16 20 23-24 16,6			21		4				52° S. 60° W. d'après La Plata P 15h 23m,88 2060 Sucre eP 26,28 3760 La Paz P 27,00 4180
19 »	St	e ₁ e ₂ L F	10 38 43 50 13 50								V. E. Galitzine. »	Zagreb eP 10h 39m 16s 8890
	Al	e e L? M M M M M F	10 39 07 51 20 59 11 52 56 12 04 09 15 35			15 25 20 20 18 18	6 10 9	4 5 7 4				
	Pa	eL M F	11 48 50-51 12,8			21-22	14	9				
20 »	St	eL M F	13 30 42 30 14 03			14	+15	+15			V. E. Galitzine.	Japon Sud de la côte de Yaku-Jima Préfecture de Kagosima.
	Pa	eL M F	13 38 44 14,0			20-23	23	17				Nagasaki eP 12h 47m 36,5 285 Hukuoka P 47 49 410 Kobe P 48 16 670
21 »	St	eL F	17 19 45								V. E. Galitzine. »	
23 »	Al	e S M F	2 48 11 48 42 49 18 55			3	2			(300)		Région de Constantine
23 »	St	iP _v e(S) eL F	18 04 09 13 57 30 19 15							(8550)	Compression.	Mer d'Okhotsk
	Pa	iP e(S) L M ₁ M ₂ F	18 04 13 14 07 35 43-44 45-46 19,3			24-21 24-20	15 13	5 6		(8680)		Côtes du Kamtchatka. Kobe P 17h 57m 15s 2550 St-Louis indique 53° N, 157°8 E
	Be	Pn	18 04 16								Pas d'autres [phases dis- tinctes.	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km.	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
25 oct.	St	e ₁ e ₂ F	12 42 45								V. Galitzine. » »	
			dans le suivant.									
25 »	Pa	e ₁ e ₂ L M ₁ M ₂ F	12 45 21 56 13 10 15-16 17-18 14,1			21-22 22	21	33 68				Nicaragua. deux séismes différents ? d'après U. S. C. G. S. 12° N, 86° W. J. S. A. 11° 2' N, 87° W. Ressenti à Managua.
	St	iP eS eRS ₁ eL M ₁ M ₂ M ₃ M ₄ F	12 48 39 57 15 13 02 13 10 18 30 22 00 25 20 27 30 14 30			18 16-13 16 15		-43 +23 +19 +21	+41 -29 +21 +16	7140	Compression. N. S. faible et irrégulier.	St Louis 12h 38m 46s La Paz 39 42,5 3590 km Ottawa 39 54
	Al	eL M F	13 06 14 40			21	10	15				
	Be	eL M F	13 15 16-21 13 30									
26 »	St	eR ₁ P ? R ₂ S ? F	4 32 (02) 33 39 38								(750 ?)	Mer Adriatique. Côtes Dal- mates. Zagreb P 4 30 17 Tarente P 30 18 220 km Trente eP 30 40 550 km
	Be	e F	4 33 05 37									
27 »	Al	P S F	5 23 29 23 46 26				(2)	(2)		150		
28 »	Pa	traces	15 19-25								Vertical.	
29 »	Al	LM	10 49			25		3			1	Algérie.
30 »	St	e(P) L F	4 36 (02) 5 07 36								V. Galitzine. V. E. Galitzine.	Mexique. Fosse d'Acapulco. 14° 3' N 96° 2' W. Tucson P 4h 28m 0,2 St-Louis 28 29 Cincinnati 28 49
	Pa	eL M F	5 07 11-12 23			22		6				Japon. S. E. Hokkaido.
31 »	St	eL F	20 51 21 13								V. Galitzine. »	Mexique. d'après U.S.C.G.S. 26° N 106° W J.S.A. 25,9° N 105° W
1er Nov.	St	iP PR ₁ eS ePS L M F	4 25 23 28 35 35 49 36 41 55 5 04 30 30			15-14		+19	+18	10450?	Dilatation.	Tucson iP 4h 14m 35s 655 km St-Louis eP 16 51 1990 km Berkeley iP 17 03
	Be	iP eL F	4 25 24 56 5 12									
1er »	Pa	eL M ₁ M ₂ F	4 53 54-55 5 01-02 5,5			26 16-16	6	21 12				
	Gr	L	5 00-20									Ressenti en Colombie. 3° N 80° W d'après La Paz P 16h 13m 26s 2530
	St	eL F	16 32 17 24								V. E. Galitzine. »	

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
6 nov.	Al	e (S) L M M M F	4 5 5 5 5 6	24 37 07 30 36 43	23 25 20 21 20	10	2	5 6 7				
	St	P' PR ₂ PR ₁ L F	4 7	24 31 34 48 00	44 35 39 				16600			Region Nouvelles Hébrides vers 18°S 167°E. Sydney P 4 ^h 09 38 Honolulu eP 14 40 Manille 14 50
	Pa	eP L M F	4 5 6,5	24 17 33-34 5	46 	20-22	12	15				
	Be	eP _N L F	4 5 6	24 15 00	51 							
7 »	St	eL	16	06-58						V. Galitzine.		Emergences seulement. St-Louis e 15 41 00 Honolulu e 15 42
	Pa	eL F	16	12 45								
10 »	St	e L F	12 13 14	47 (29) 30 50						V. Galitzine. V. E. Galitzine. »		Région Nouvelle Calédonie ou dans la Fosse Tonga.
	Pa	eL M ₁ M ₂ F	13 14,3	54 57-58 59 60 3		17 19	5	3				Nouvelle Zélande iP 12 ^h 30 ^m 3 Sydney P 32 00 Manille P 37 51
11 »	Al	e(P) L M M F	22 23	53 04 27 31 35 45	46 22	19 18	3 7	5 3				Océan Indien. 15°S 56°E Tananarive P 22 45 02 Bombay P 50 27 Helwan P 52 02
	St	e(P) eL F	22 23 0	54 36 15						Galitzine.		
	Pa	traces	23	40-60								
12 »	Al	eP S F	5	47 47 48	43 46		(1)	(1)	25			Algérie local.
12 »	Al	eP S F	5	48 48 48	17 20 30		(2)	(1)	25			Algérie.
14 »	Al	eP S F	4	00 00 01	43 46		(1)	(1)	25			Algérie.
14 »	St	e ₁ e ₂ L F	4 5	43 02 30	00 49					V. Galitzine. Galitzine.		Asie vers 36°N 73°E Bombay P 4 ^h 36 ^m 46 ^s Calcutta P 37 16 Phû-Lien eP 39 40
	Pa	traces	5	03-15								Algérie Bouzareah III région Douéra ?
15 »	Al	eP S F	20	56 56 57	03 06		(2)	(2)	25			Ressenti en Italie région Udine.
16 »	St	P S R ₁ S	3	18 19	29 28 37				450			

Région Nouvelles Hébrides

vers 18°S 167°E.

Sydney P 4^h09 38

Honolulu eP 14 40

Manille 14 50

V. Galitzine.

Emergences seulement.

St-Louis e 15 41 00

Honolulu e 15 42

V. Galitzine.

V. E. Galitzine.

»

Région Nouvelle Calédonie
ou dans la Fosse Tonga.

Nouvelle Zélande iP 12^h30^m3

Sydney P 32 00

Manille P 37 51

Océan Indien.

15°S 56°E

Tananarive P 22 45 02

Bombay P 50 27

Helwan P 52 02

Galitzine.

Algérie

local.

Algérie.

Algérie.

V. Galitzine.

Galitzine.

Asie

vers 36°N 73°E

Bombay P 4^h 36^m 46^s

Calcutta P 37 16

Phû-Lien eP 39 40

Algérie

Bouzareah III

région Douéra ?

Ressenti en Italie région

Udine.

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
16 nov.	St	R ₂ S F			46 24							
17 nov.	Al	eP S F	17	24	41 44 25		(1)	(1)				Algérie.
18 »	St	e	14	53-54							Grand pendule.	
20 »	Al	iP (PS) S L M M M M F	20	48	12 42 04 17 23 24 30 29 30 25					9860		Chili Région Antofagasta.
	Pa	eP _r PR eS L M ₁ M ₂ M ₃ F	20	48	38 27 14 17 22-23 27-28 28-29 22,3			50		9500		d'après U.S.C.G.S. 23° S 73° W. J.S.A. 23°1S 75°4W.
	Gr	eP L F	20	48	44 23 10							
	St	P iP' ePS L M F	20	48	48 50 05 22 30 18	19			-41	14300 d'après P'-P.	Compression. irrégulières.	
20 »	Pa	iP S L F	20	48	50 indiscernables. 21 22							
	Be	eP i L M F	20	51	59 38 18 21 26-29 45							
	PD	P PR ₁ L F			indiscernables. 20 52 50 21 24 22 30						Inscription peu nette.	
21 »	St	eL	17	51-18	06						V. E. Galitzine.	Philippines. Centre de Luzon. Manille iP 17h 00m 19s 140km
22 »	St	e ₁ e ₂ L F	8	44	00 53 20 15						Galitzine. forte agitation.	Océan Atlantique Sud. 62°S 7°W
	Al	eP? S eL M M F	8	44	24 32 11 19 30 52					(10.250)		d'après La Plata P 8h 38,9s 4520km Sucre iP 41m 07s 7200km La Paz P 41 22
	Pa	e(P) (L) M ₁ M ₂ F	9	05	10 13 25-26 28-29 10,4							
	Be	traces	9	13-50								

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épacentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
25 NOV.	Al	iP S F	1	07	15		(27)	(15)		50		Région Castiglione Tipaza.
27 »	Pa	traces F	9	56							Vertical.	Inscrit par les stations amé- ricaines.
	St	eL	10	01-29							V. Galitzine.	Victoria P 9 ^h 22 ^m 59 ^s 2000 ?
28 »	Pa	eL M F	2	09		17		5				Côtes Mexique. Fosse d'Acapulco. 16° 3N 102° 5W St-Louis iS 1 ^h 32 ^m 35 ^s
	St	L	2	12	39						Galitzine.	
28 »	Pa	traces F	7	50								St-Louis iP 7 ^h 49 ^m 35 ^s
	St	L F	7	51							Galitzine.	
28 »	St	eP ePR ₁ PR ₂ PS L M ₁ M ₂ M ₃ F	10	58	(00)					12500 d'après PR ₁ -P.	int. min.	Océanie. SW des Célèbes. Batavia iP 10 ^h 46 ^m 41 ^s Melbourne 49 20 Phù-Lien 49 43
			11	02	21							
			11	04	55							
			12	55								
			36			18			+11			
			54	30		15			+14			
			58	10		15			-10			
			12	01	40							
			13	50								
	Be	eP eS M F	11	02	44							
			12	22								
			55-56									
			12	12								
	Pa	iP e L M ₁ M ₂ F	11	02	53	28-20	28	10				
			12	32		22-29	15	30				
			22									
			46-47									
			51-52									
			13,6									
	Al	L M M F	11	50		21		16		50	Forte agitation, P et S indiscernables.	
			55			18	8	15				
			59									
			12	20								
28 »	Ba	eP iS F	14	17	39						local.	Pyrénées.
			18	06								
			20									
28 »	Al	eP S F	17	01	18							Castiglione, réplique.
			01	24		(1)						
			01	40								
29 »	St	eL	13	14-44							Galitzine.	Pacifique Côte Chili. 24° 2 S 80° W
	Pa	eL F	13	16								d'après Sucre et La Pas.
			35									
29 »	Pa	traces	15	15-30							Vertical.	
29 »	Pa	»	16	03-11							»	
29 »	Pa	e L M F	17	01		13-16	3	3				Pacifique. Melbourne iP 15 ^h 49 ^m 43 ^s 37°
			18	05								
	St	eL F	17	07							Galitzine.	
			18	13								
29 »	St	e ₁ e ₂ L F	18	20							forte agitation. Galitzine.	Pacifique Sud. Apia P 18 ^h 06 ^m 45 ^s 8 50, 36° 8.
			26									
			19	20								
			20	56								

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
29 Nov. (suite)	Pa	e ₁	18	20	23							
		e ₂		24	47							
		L		30								
		M ₁		44-45		15		4				
		M ₂		46-47		15	3					
		F	dans le suivant.									
29-30	Pa	eL	19	26								
		M ₁		41-42		18		7				
		M ₂		50-51		17-17	6	4				
		F		20,7								
		traces	19	40								
		F	20	00								
30	Pa	traces	23	29-41								
		e	24	33								
		L	0	26								
		F	1	32								
		traces	3-4 ^h									
		F	3	16								
1 ^{er} Déc.	Al	eP	4	19	57							
		PR ₁		24	07							
		S ₂		31	35							
		L		48								
		M		56		20	100					
		M		59		20	350	210				
	Ba	M	5	01	30	20		850				
		M		02	30	20		900				
		M		04	30	18	680					
		M		07		18	640	420				
		M		36		15	75	25				
		F	7	10								
	Ma	eP	4	20	17							
		ePR ₁		24	29							
		SP _c S		31	06							
		PS		34	40							
		L		42								
		M ₁		54	47	24	(3)					
	St	M ₂	5	06	00	20	(8,1)					
		M ₃		08	05	17	(8,5)					
		M ₄		17	05	15	(6)					
		F	dans le suivant.									
		eP	4	20	20							
		ePR ₁		24	59							
	St	PS (?)		34	18							
		L		50								
		M ₁	5	07	53	20		437				
		M ₂		11	03	15		313				
		F	9									
		P	4	20	34							
	St	PR ₁		24	41							
		ePR ₂		28	(00)							
		ePR ₃		30	10							
		SP _c S		30	41							
		PS		34	44							
		L		56								
	St	M ₁	5	02	00	30		-260				
		M ₂		03	10	30		+420				
		M ₃		30		30		-358				
		M ₄		06	00	18		>290				
		M ₅		30		24		+530				
		M ₆		08	00	24-22	+740	+640				
	St	M ₇		10	00	18		-760				
		M ₈		11	05	18	+383					
		M ₉		12	20	18		+356				
		M ₁₀		30		18		>290				
		M ₁₁		55		16	-285					
		M ₁₂	14	10		18		+510				

Vertical.
V. Galitzine.
»
»

(10930)

Chili
Destructeur.

12200

d'après
U.S.C.G.S. 36°S 74° W
J.S.A. 33°S 74°5W

12500

Compression.
int. min.

Destructeur au Chili, région
Talca, Curico, etc.

Calculés sur H. Wiechert
et V.
Galitzine.

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscopale probable	
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _Z μ				
1er Déc. (suite)	St	M ₁₃	16	30	18	+327							
		M ₁₄	19	20	18	-318							
		M ₁₅	20	00	18								
		M ₁₆	23	00	16	+314	-254						
		F	9	20									
	Pa	e ₁	4	20	25								
		e ₂		24	54								
		e(S)		31	20							Débuts incertains.	
		L		50									
		M ₁	5	04-5	28-26	400	780						
		M ₂		05-6	23-23	900	930						
		M ₃		07-8	21-25	500	950						
		M ₄		08-9	20-21	340	400						
	F	9,3											
	PD	eP	4	20	32								
		ePR _{1E}		24	40								
		S _c P _c S _E		31	00								
		PS		34	24								
		L		50									
	Be	F	8	30									
eP		4	20	40									
ePR ₁			25	02									
e			31	27									
S			34	24									
1er »	St	L	13	03									
		F	11	18								Galitzine.	
		St	L	18	51								»
			F	20	21								»
		St	e ₁ (P)	4	35								
	e ₂ (PR)			38									
	i(PS)			49	00								
	L			57									
	M ₁		5	22	50	18-20	+35	+42					
	M ₂			24	30	16-18	-39	-60					
	M ₃			27	20	16	+29	+40					
	M ₄			29	00	15	+38						
	M ₅				40	16-15	+44	+40					
	M ₆			35	10	15	-23	-23					
	F		8	20									
	Pa		e ₁	4	39	07							
			e ₂		45	21							
		e ₃		48	33								
		L	5	11									
		M ₁		19-20	21-24	40	60						
M ₂			22-23	20-21	50	50							
M ₃			23-24	20-19	50	40							
F		7,4											
Be	e	4	48	37									
	L	5	12										
	M		23-29										
	F	6,0											
Al	L	5	05		50								
	M		11	30	35	60	80						
	M		19		20	60	80						
	M		25		15	15	25						
	F	6	40										
	3 »	Al	P	5	30	00							
S				31	04								
M				32		7		20					
F				40									
St		e	5	33									
		M		37									
		F	6	00									

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A _N μ	A _E μ	A _S μ			
3 Déc. (suite)	Be	groupes	d'ondes de	5 h. 35	à 44							
	Pa	eL M F	5 36 37-38 49	12-12	2	5						
3 »	St	eL	13 06-39							V. E. Galitzine.		
5 »	Be	eP i F	3 18 33 18 45 19,7								Ressenti en Suisse Région Orbe-Yverdon.	
	St	eS RS RS F	3 19 23 19 32 43 22						230			
7 »	Pa	e(P) e L M ₁ M ₂ F	9 35 26 42 10 15 18-19 30-31 11,8	23-33 27-27	16 28	35 24					Océanie. Région SW Nouvelle Guinée 4°S 134°E. Batavia iP 9h 19m 43s Sydney P 20 30 Phû-Lien P 21 07	
	St	e ₁ e ₂ L M ₁ M ₂ M ₃ F	9 33 44 10 00 18 30 19 30 32 40 12 03	21 15 19	+30	+33 +35	-22			V. Galitzine. V. E. Galitzine.		
	Be	L F	10 15 40							forte agitation.		
9 »	St	e L F	0 19 1 03 2 20							V. Galitzine. Galitzine. »	Région SW îles Salomon. Melbourne Pi 0 04 00.	
	Pa	eL F	1 16 39									
9 »	St	e ₁ e ₂ L F	5 24 37 6 00 7 15							V. Galitzine. E. Galitzine. Galitzine, »	Réplique ? Melbourne P 5h 11m 38s 32°,9	
	Pa	eL F	6 21 6,8									
9 »	St	eL F	18 31 20 44							Galitzine. »	Réplique Données incomplètes d'après Wellington P 18h 17m 33s 33°,4 10°S 157°E	
	Pa	eL M F	19 24 29-30 19,9	21-22	4	4						
10 »	St	iP iS eL F	7 07 01 10 21 15 22						1970 ?	Dilatation.	Mer Ionienne vers 35°N 21°E. Helwan iP 7h05m05s Belgrade P 05 13,7 850km Zagreb eP 05 48 1710	
	Al	P iS LM F	7 07 01 10 13 11 30 20	5	1				1870			
	Be	iP iS	7 07 06 10 21							Autres phases confondues avec l'agitation.		
	Pa	iP iS L F	7 07 34 11 22 14 7,5	5-9	7	5			2290			
10 »	Pa	eL	16 04-19							Vertical.		

International
Seismological
Centre

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épiscoptrale probable			
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ						
12 Déc.	St	iP	20	39	45					12500 environ	Compression.	Océanie Région îles Fidji. 28°S 177°W Wellington P 20 ^h 23 ^m 25 ^s Sydney P 25 48 Manille eP 31 23			
		iPR ₁		44	01										
		iPR ₂		47	40										
		ePR ₃		49	10										
		PS		54	34										
		L	21	20											
		M ₁		55	00	18	+12								
		M ₂		59	20	18									
		M ₃	22	00	30	17		+13	+17						
		M ₄		01	50	16									
		M ₅		06	40	16			+12						
		M ₆		07	30	16			-10						
		F	23	50				-8							
	Pa	iP	20	39	46					150 ?	Vertical.				
		e(PR)		44	03										
		e		51											
		L	21	45											
		M ₁		52-53		21-21	13	11							
		M ₂		56-57		22-21	14	12							
		F	23,2												
	Be	e	20	44	47										
		eL	21	50											
		F	22	30											
	Al	Agita-	tion, P et S			indis-	cerna-	bles.							
		L	20	56											
		M	21	01	30				10						
		M		10					13						
		M		18					9						
		F		35		16									
13	St	e	3	31	36					150 ?	Vertical.	Emergences seulement.			
		eL		35											
		F		46											
13	Pa	traces	entre 3 ^h et 4 ^h												
	St	e(P?)	19	37	01							Ressenti en Rhénanie.			
		S?			21										
		R ₁₂ S?			51										
		F		40											
	Pa	e ₁	19	37	06										
		e ₂		37	53										
		F		40											
	Be	e	19	38	02										
		F		38,8											
14	St	L	0	44						180	Vertical.	Données insuffisantes.			
		F	2	07											
14	Pa	eL	1	05		13									
		M		06-7					2						
		F		13											
14	Pa	traces	de L entre 9 h.			et	11 h.								
14	Pa	"	" " 12 h.			et	13 h.								
16	Al	iP	18	44	50							Algérie. Région du Mont Sila.			
		S		45	12										
		M		45	17		(6)	(3)							
		F		50											
16	Al	iP	18	51	01					180	V. Galitzine. forte agitation.	Réplique.			
		S		51	23										
		M		51	28		(2)								
		F		52											
19	St	traces	de L à diverses reprises			entre	2 h. et 8 h.								
19	Al	e _E	11	42	12										
		S _E ?		56	25										

Date	Sta- tion	Phase	Heure			T s	Amplitudes			Δ km	Remarques	Région épicentrale probable
			h.	m.	s.		A_N μ	A_E μ	A_Z μ			
19 Déc. (suite)	Al	L	12	29		60						
		M		33		40						
		M		39		32	20	(120)				
		M		42		22		28				
		M		48		19	35	35				
		M		59		20	30	10				
		F	13	40								
	St	eP	11	51	02							
		iPR ₁		55	20							
		PR ₁		58	28							
		PR ₂	12	01	10							
		PS		04	38							
		SR ₁		10	45							
		L		30								
		M ₁		33	00	23-26	+290	-250				
		M ₂		35	00	22-24	-380	>270				
		M ₃		36	30	20			+105			
		M ₄		38	10	22		+170				
		M ₅		39	00	22-20	>280		-135			
		M ₆		40	30	18-20	-115	-134				
						18			>132			
		M ₇		42	15	18			-120			
		M ₈		43	00	18		+105				
		M ₉		45	30	20	-145					
		M ₁₀		46	30	15			+82			
		F	17	00								
	Pa	e ₁	11	52	03							
		e ₂		55	56							
		e(S _N)	12	03	48							
		L		23								
		M ₁		29-30		45-42	300	170				
		M ₂		37-38		22-23	280	230				
		M ₃		43-44		21-20	220	240				
		M ₄		46		19-21	160	180				
		F	14,8									
	PD	P	indiscernables									
		ePR ₁	11	55	(00)							
		L	12	18								
		F	14	15								
	Be	e(PR ₁)	11	55	28							
		eS	12	01	51							
		L		16								
		M		31-45								
		F	13	30								
	Ba	L	12	10								
		F	13	40								
24 "	Al	iP	7	15	48							
		S?		16	05							
		M		16	09		(15)	(12)				
		M			47		(6)					
		F		20								
26 "	St	eL	21	03								
		F		45								
27 "	Pa	traces	22	00-30								
	St	eL	5	46								
28 "	Pa	F	6	27								
	St	traces	5	50								
29 "	St	F	6	15								
		eP	14	33	32							
		ePR ₁		37	47							
		e(PS)		47	(00)							
		eL	15	00								
		M ₁		19	00	15			+17			
		M ₂		20	15	16			-23			
30 "	St	M ₃			45	15	+40					

Philippines.
6° N 124° 5 E
Mer des Célèbes.
Destructeur au S de Min-
danao.

Manille iP 11^h 39^m 18^s 1040
Phù-Lien iP 42 11 2550
Zi-Ka-Wei P 42 31

Débuts incertains.

int. min.

Autres phases indiscerna-
bles.

Algérie.
Région de Rouina.

V. Galitzine
»

Vertical.

V. Galitzine.
»

Philippines.

int. minute.

Réplique.

III. Les Tremblements de Terre en France et aux Colonies

par E. ROTHÉ, J. LACOSTE, C. BOIS et M^{me} A. HÉE

RÉGION DES PYRÉNÉES

16 Janvier à 5 h. 28 m. 20 s. — Le séisme ne s'est pas étendu à la totalité du département des Hautes-Pyrénées, car dans l'arrondissement de Tarbes rien ne fut perçu à Vic-en-Bigorre (ch. l. c.) ; [à Ossun, (ch. l. c.), une secousse indiquée ne coïncide pas avec l'heure signalée]. Au chef-lieu d'arrondissement, Bagnères-de-Bigorre, rien n'a été ressenti.

Ce n'est que dans l'arrondissement d'Argelès-Gazost que la secousse est nettement perçue : *Argelès*, 1 sec., S.E.-N.W., III (Baran, secr. mairie) ; *Aucun*, ch. l. c., 1 sec., 1 s., vers N.W., gronde-ment sourd, II à III (mairie).

Dans le département des Basses-Pyrénées au contraire, les réponses positives sont très nom- breuses sauf dans l'arrondissement de Bayonne (néant à *Hasparren* et *Saint-Jean-de-Luz*, mairie).

Dans l'arrondissement de Mauléon, le canton de Saint-Palais indique néant, le degré III est atteint au chef-lieu de canton *Iholdy* (Sagasse, inst.), tandis que les communes de *Suhescun* et de *Arhansus* n'ont rien ressenti.

Dans le canton de Mauléon-Licharre, *Ainharp* indique néant, tandis qu'au chef-lieu d'arrondis- sement *Mauléon-Licharre*, le Dr Henyas, maire, signale le degré III, également atteint dans les lo- calités de *Viodos-Abense* (Gastarriet, inst.) ; d'*Aussurucq* (Campané, inst.) et de *Barrens* (Fréchar- doy, secr. mairie).

Dans le canton de Tardets-Sorholus, III à *Sainte-Engrâce* (M^{me} Bengochéa), III aux *Trois-Vil- les* (Darrière, inst.).

Dans l'arrondissement d'Orthez, au N.-W, les réponses sont négatives à *Salies-de-Béarn* et dans une partie du canton de Lagor, à *Arance*, *Birron*, *Ozenx*, *Maslacq* (mairies). — Au chef-lieu *Lagor*, degré III-IV, (Tucat, inst.). La même intensité est à peu près atteinte à *Gouze* (Hayet, cult.) ; *Montestrucq* (M^{lle} Touya, inst.) ; *Mourenx* (Baquier, prop.) ; *Sauvelade* (Lacave-Lavin, cult.) ; *Viellèsèque* (Perrot, inst.). Partout on signale une rumeur sourde, les directions indiquées sont très variables.

Dans le canton d'Arthez, plus au nord, au-delà du Gave de Pau, néant à *Artix*, *Castillon*, *Ces- cau*, *Doazon*, *Hagetaubin*, degré III au chef-lieu *Arthez* (mairie), *Casteide-Cami* (Lartigue, charpen- tier), *Casteide-Candou* (M^{me} Adoue).

A *Navarreux*, ch. l. c., 2 sec., la dernière plus forte, III (La Carde, conc. de mairie). Il est re- marquable qu'à *Arzacq*, ch. l. c., très au nord, une selle suspendue contre le mur de l'écurie soit tombée et que la propriétaire, sur le point de partir, et baissée dans l'écurie, ait failli perdre l'équi- libre. Le degré atteint le chiffre IV, tandis que le degré III est seulement atteint à *Louvigny* (Goailhard, inst.), et que les communes de *Malaussanne* et *Mialos* signalent néant.

Dans l'arrondissement de Pau, rien n'est signalé dans les cantons de Garlins, Lambeye, Pon- tacq, Thèze. A *Pau*, préfecture, le Dr Meunier, directeur de l'Observatoire météorologique, indique le degré III-IV, vibration des meubles, portes, fenêtres, avec bruit sourd. La moitié de la population aurait ressenti le phénomène. A *Lescar*, ch. l. c., même degré avec déplacement de meubles ; on in- dique la direction W.-E. (mairie).

C'est dans l'arrondissement d'Oloron que le phénomène a été constaté avec la plus grande intensité.

Canton d'Accous : Bedous, 2 sec. à 3 s. d'intervalle, IV (Bernard). — Borce, 1 sec., W.-E., craquement de plancher, IV-V (Claverie, inst.). — Osse, 2 sec., grondement, IV-V (Estibotte, inst.). — Urdos, réveil des dormeurs, vibration des vitres et de la vaisselle, IV (Portes, rec. bur.).

Canton d'Aramits : Au chef-lieu, toute la population a ressenti une secousse et entendu un grondement, W.-E., V (Lannereton, maire). — Issor, 2 sec., chute d'un tuyau de poêle et d'un vieux mur en pierres sèches le long d'un chemin, V (Baradat, inst.). — Lanne, 2 sec., objets assez fortement secoués, W.-E. (Caubisens, ébéniste).

Canton d'Arady : Izeste, vibration de vaisselle, bruit souterrain, IV (Bergi, prop.).

Canton de Laruns : Aste-Béone, toute la population a entendu le bruit souterrain, S.-N., IV (Boris, maire). — Béost, 1 sec., S.-N., III-IV (Laborde). — Eaux-Bonnes, 2 sec., bruit sourd, S.-N., III-IV (Moulat, secr. mairie). — Gère-Bélestin, 2 sec. à 5 m. d'intervalle, la première plus forte en durée et intensité, S.W.-N.E., vibration de vaisselle, craquements de meubles (Baradat, inst.). — Laruns, ch. l. c., III-IV (mairie).

Canton de Lasseube : 1 sec. ressentie par nombre de personnes, choc brusque suivi de vibrations venant de E., S.-E., III-IV (R. Lapeyre, prof. hon.).

Canton de Monein : Abos, IV (M^{me} Bégué, mairie). — Cuqueron, 2 sec. de haut en bas, S.E.-N. W. (J. Laplace, inst.). — Lahourcade, III-IV (P. Lasserre, cult.). — Monein, ch. l. c., 1 sec., réveil des dormeurs, S.W.-N.E., IV (mairie). — Parbayse, 2 sec., III-IV (Bégué, inst.).

Canton d'Oloron-Sainte-Marie : Agnos, 2 sec. à 45 s. d'intervalle, la première plus forte, vibration de vaisselle, tintement de sonnettes, bruit à la deuxième secousse, V (Capdevielle, prop.). — Asasp, 2 sec. à 2 min. d'intervalle, choc brusque, de bas en haut, bruit, IV (mairie). — Cardesse, 1 sec., craquement de meubles, S.-N., IV (Coïgdarens, ébéniste). — Escourt, 1 sec., III (Ferranet, inst.). — Estos, 1 sec., ressentie par tous les habitants, craquement de meubles, S.E.-N.W., (Labourdet, agric.). — Géronce, 1 sec., bruit de vaisselle, craquements, IV (Hagolle, inst.). — Geüs, vibrations, craquements de planchers, IV (Cassou, cult.). — Herrère, S.W.-N.E., craquements (Bioy, maire). — Moumour, 1 sec., vibration de vaisselle, chute de cadres, V (Navarret, maire). — Oloron-Sainte-Marie, ch. l. arr., 2 sec., dernière plus forte, balancement lent de S.-N., V (mairie). — Saint-Goin, craquements, IV-V (Jouanillou, maire). — Laucède, 1 sec., balancement lent, craquements, W.-E., III-IV (M^{me} Pontacq, inst.).

Si l'on se reporte à la carte, on constate que les localités les plus secouées se répartissent dans les vallées du Gave d'Oloron et de ses affluents. Les vibrations sont moindres le long du Gave de Mauléon. La surface pléioséiste en France s'étend entre les Pyrénées et Oloron. Il est vraisemblable que l'épicentre se trouve dans le massif pyrénéen, sur la frontière ou en territoire espagnol.

La station séismologique de Tortosa a inscrit le début du phénomène à 5 h. 28 m. 58 s. et indique une distance de 270 kilom., ce qui est d'accord avec les conclusions précédentes. Bagnères-de-Bigorre a inscrit une phase à 5 h. 29 m. 21 s., qui ne peut être le début du phénomène et une plus forte impulsion à 5 h. 29 m. 25 s.

25 Janvier à 14 h. 40 m. — Au cours de l'enquête relative au précédent séisme, des observateurs nous ont signalé une secousse dont le degré maximum est IV et qui peut être considérée comme une réplique du précédent. Les intensités et les directions sont à peu près les mêmes (MM. Baradat Ch., inst. à Gère-Bélesten, canton de Laruns et Baradat Honoré, inst. à Issor, canton d'Aramits.).

7 mai à 5 h. G — 10 h. 01 m. G. — Ce séisme a été très peu intense, car malgré plusieurs envois de questionnaires, très peu de réponses sont parvenues ; plusieurs sont négatives. Les plus nettes permettent de conclure qu'il s'agit encore de la région d'Oloron-Sainte-Marie, où le degré n'a pas dépassé III (E. Saint-Jean, inst., à Asarp, Caudehore, à Arros, canton d'Oloron-Ste-Marie). Il y eut d'ailleurs, à quelques jours d'intervalle une autre faible secousse à 11 h. du matin (10

h. 01 G.) ressentie par les ménagères au travail ou les enfants dans les classes. Aussi plusieurs instituteurs, en signalant le fait, disent ne pouvoir préciser leurs souvenirs, mais promettent de tenir dorénavant registre des phénomènes de ce genre (maire de Mifaguet, Bergez, inst. à Rébénacq, canton d'Arudy, maires de Gurmençon et de Poey, canton d'Oloron-Sainte-Marie). Ce dernier séisme a été inscrit par les instruments de Bagnères : F 10 h. 01 m. 33 s. (voir ci-dessus p. 24).

21 août, à 23 h. 40 m. ou 22 (mercredi) h. d'été 0 h. 40 m. — 22 août à 16 h. — Ce séisme a été d'intensité très faible, nombre de localités ne l'ont pas senti, mais il s'est étendu assez largement aux départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne (Arr. de Saint-Gaudens). L'heure du séisme et la confusion entre les heures d'été et d'hiver, les nouvelles de presse portant des dates et heures variées, ont fait croire à l'existence de deux séismes dans les nuits de 21 au 22 et du 22 au 23. Il n'en est rien d'après l'enquête faite, aucun observateur n'indiquant la succession de deux séismes à une nuit d'intervalle.

Trois observateurs (Latour, à Ancizan et Seribésseus, à Guchen, localités du canton d'Arreau, Barrère, charpentier à Cier-de-Luchon, canton Bagnères-de-Luchon) signalent un faible mouvement de balancement vers 16 h. le mercredi 22 ; ce serait peut-être une réplique du tremblement principal.

Je résumerai l'enquête dans le tableau ci-dessous. La majorité des observateurs signalent de faibles craquements, avec direction variant de S.W.-N.E. à W.E., un fort grondement souterrain. Il y eut deux secousses à intervalle assez prolongé, mais mal défini.

HAUTES-PYRÉNÉES

ARRONDISSEMENT DE TARBES. — Réponses négatives des cantons de Tarbes (Tarbes et Alies), Tournay, Pouyastruc et Maubourguet (Sauveterre). — *Castelnau-Magnoac*, III (Bogues, sec. mairie).

ARRONDISSEMENT D'ARGELÈS-GAZOST. — *Argelès*, III (Barax, secr. mairie). — *Lourdes*, III (Seyrès, archit.).

ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE. — *Canton d'Arreau* : *Arreau*, IV (M^{me} Cartan, secr. mairie). — *Aspin*, IV (Estradé, maire). — *Burrancouen* (mairie). — *Bazus-Aure*, IV (M^{me} Souret). — *Beyrède-Jumet*, IV (Arné). — *Cadéac*, IV (maire). — *Camous*, IV (Gaudry). — *Fréchet-Aure*, IV (Vidailhet). — *Gouaux*, IV (Ribaut). — *Grézian*, IV (Bacqui, cult.). — *Guchen*, III (Gailhard). — *Jézeau*, IV (mairie). — *Lançon*, IV (Benque). — *Pailhac*, IV (maire). — *Sarrancolin* (Castet, inst.).

Canton de Bagnères-de-Bigorre : *Antist*, pendules arrêtées, III (M^{lle} Lafforgue). — *Cieutat*, IV, (Bourdettes, inst.). — *Pouzac*, III (Brune, maire). — *Trébons*, III (Duclos, secr. mairie).

Canton de Bourdères-Louron : *Anéran-Camors*, III (Borde, maire). — *Avajan*, néant (maire). — *Bordères-Louron* : III (Pélieu, maire). — *Campan*, III (Despiau, secr. mairie). — *Cazaux-Fréchet*, III-IV (Gasbarrou, maire). — *Gérin*, néant (mairie). — *Loudervielle*, III (Capcarrère, maire). — *Vieille-Louron*, senti (maire).

Canton de La Barthe-de-Neste : *Arrodets*, IV (mairie). — *Asque*, *Avezac-Prat*, néant. — *Bazus-Neste*, IV-V (Latour, maire). — *Bizous*, IV (maire). — *Escala*, IV (Galan). — *Esparrros*, *Hèchès*, néant. — *Izaux*, chute de pierres dans les cheminées, IV (maire). — *La Barthe-de-Neste* III-IV (Dandré, maire). — *Labastide*, IV (Abadie, maire). — *Laborde*, III (maire). — *Lahitte*, III (Barbazan, maire). — *Lomné*, III (Morillon, maire). — *Lortet*, III (Rey, secr. mairie). — *Montausset*, III (Vigneaux, maire). — *St-Arroman*, IV (mairie). — *Seich*, IV (mairie).

Canton de Lannemezan : *Artigueny*, III (mairie). — *Capvern*, III (Lurian). — *Lagrange* (Galan, maire). — *Lannemezan*, néant. — *Molère*, III (Duthu). — *Péré*, III (Galan, maire). — *Tilhouse*, néant.

Canton de Mauléon-Barousse : *Anla*, III (mairie). — *Cazarilh*, III (Uchan, maire). — *Esbareich*, III (maire). — *Loures-Barousse*, IV-V (Rumeau, maire). D'après le Dr Dencausse, de Frontignan, quelques lézardes et pierres tombées de cheminées. — *Mauléon-Barousse* : III (maire). — *Ourdo*, III-IV (maire). — *Saléchan*, néant. — *Sainte-Marie*, III (Siméon, maire). — *Sost*, IV (Sost, cult.). — *Thèbe*, III (mairie).

Canton de Saint-Laurent-de-Neste : *Anères*, IV (maire). — *Bize*, IV-V (Miegeville, inst.). — *Générest*, III-IV (Verdier). — *Hautaget*, III (Dupuy). — *Mazères*, IV (Cabail). — *Montsérié*, IV

(Caumont). — *Nestier*, III-IV (Bazerque, adjoint maire). — *Saint-Laurent*, IV (maire). — *Seich*, IV-V (Castéran, inst.). — *Tuzaguet*, IV (Barrère).

Canton de Vieille-Aure : Soulan, III (mairie).

HAUTE-GARONNE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-GAUDENS. — *Canton d'Aspet : Aspet*, III-IV (mairie). — *Cabanaç*, III (Bertrand). — *Couledoux*, III (Desbarax, secr. mairie). — *Courc*, III (Boué). — *Estadens*, III (Ribet). — *Herran*, III (Marrot). — *Izaut-de-l'Hôtel*, III (Gautier, cult.). — *Montcamp*, néant. — *Portet-d'Aspet*, III-IV (Longue). — *Sengouagnet*, III (M^{lle} Milhas).

Canton de Bagnères-de-Luchon : Artigue, III (mairie). — *Bagnères-de-Luchon*, III-IV (mairie). — *Castillon de Larboust*, III (Anizan, maire). — *Caubous*, III (maire). — *Cirès*, II (maire). — *Garin*, réveil des dormeurs, IV (Stieber, rentier en villégiature). — *Montauban*, III (Talazac). — *Saint-Mamet*, III (Baylac). — *Saint-Paul-d'Oueil*, III (Bonderunet).

Canton de Barbazan : Ardiège, III (Ponyfourcat, maire), et les membres du conseil municipal réunis à la mairie). — *Frontignan*, IV Dr Dencausse). — *Lourde*, III (mairie). — *Martres-de-Rivière*, III (Cartery, inst. retraité). — *Mont-de-Galié*, pas de bruit, III (Ferran). — *Payssous*, III (Décaux). — *Saint-Bertrand-de-Comminges*, III (mairie). — *Valcabère*, IV-V (sonnettes actionnées, pendules arrêtées (de Grandidier, maire).

Canton de Boulogne : Saint-Lory, néant.

Canton de l'Isle-en-Dondon : L'Isle et Saint-Laurent, néant.

Canton de Montréjeau : Ausson, II-III (maire). — *Balesta*, III (Estrampes, secr. mairie). — *Bordes*, III (Tassalle). — *Boudrac*, néant. — *Cazarilh*, III (M^{me} Desprats) ; M^{me} Noilhax, de la même localité, croit avoir perçu vers cette époque un mouvement entre 5 et 7 h. (matin). Il est possible qu'il y ait eu quelques faibles secousses prémonitoires ou répliques. De là la diversité des renseignements recueillis. — *Le Cuing*, néant. — *Sèdeilhac*, II-III (Daunes). — *Les Tourreilles*, III (Marty, inst.).

Canton de Saint-Béat : Argut-dessous, III (maire). — *Argut-dessus*, III (maire).

Canton de Saint-Gaudens : Aspret, III (maire). — *Boulogne*, néant. — *Estancarbon*, II (maire). — *Labarthe-Inard*, néant. — *Labarthe-Rivière*, III (Milhas, secr. mairie). — *Lespiteau*, II (mairie). — *Lodes*, néant. — *Miramont*, III (Picheloup, secr. mairie). — *Regades*, II-III (Ribet). — *Rieucaez*, ressenti (mairie).

Canton de Salies : Néant.

L'absence de renseignements précis sur les directions ne permet pas de déduire la position de l'épicentre. Il semble toutefois qu'il s'agit d'un mouvement pyrénéen dans la région comprise entre le Pic du Midi et le Val d'Aran. Le séisme a été inscrit à Bagnères-de-Bigorre. L'inscription a été interprétée au Bureau central de la manière suivante :

Bagnères :	iP	23	40	11	Strasbourg :	e	23	44	29
	F		41	30	(Gd. pendule)	F			47

30 août, — 19 h. 02 m. — Contrairement au précédent, ce séisme n'a pas été ressenti en Haute-Garonne, même dans l'arrondissement de Saint-Gaudens (Le Cuing, Balesta, Boulogne indiquent néant).

HAUTES-PYRÉNÉES

ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE. — Les cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, La Barthe-de-Neste, Bordères, Luron, Aucun, Lannemezan, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé, Vieille-Aure, indiquent néant ou confondent avec le tremblement nocturne du 22.

Canton de Bagnères : Antist, Argelès, Astugue, Banios, Cieutat, Hauban, Labassère, Lies, Marsas, Mérilheu, Neuilh, Ordizan, Pouzac, Trébons, Uzer n'ont rien senti.
A Montgaillard, M. Abadie dans sa maison, au rez-de-chaussée, prenant le repas du soir, a senti un choc accompagné de vibrations de la vaisselle (20 heures, été). — A Bagnères-de-Bigorre, l'Observateur qui règle les séismographes a également senti le choc ; aucune autre personne appartenant au personnel de l'Observatoire n'a rien éprouvé (Dauzère, Dir. de l'Observatoire).

A Campan, ch. l. c., un petit nombre d'habitants a constaté le mouvement (Despiau, secr. mairie). Aucune réponse positive des arrondissements de Tarbes et d'Argelès-Gazost.
Le séismographe de Bagnères indique un impétus net :

iP 19 h. 02 m. 14 s. heure Greenwich soit 20 h. 02 m. 14 s. (heure d'été).
F 03

Il serait impossible d'avoir l'heure exacte sans les stations séismologiques, les observateurs donnant le plus souvent des heures fantaisistes. C'est une preuve de l'utilité des séismographes type Bureau central, répartis dans les différentes régions de la France.

RÉGION DU SUD-EST

BASSES-ALPES

1^{er} juin à 20 h. 12 m. (heure d'été). — Ce séisme n'a pas atteint les départements limitrophes du Var et de Vaucluse. Dans les Basses-Alpes même l'arrondissement de Digne répond négativement, sauf Castellane où une vibration à peine perceptible a été signalée (mairie). C'est de l'arrondissement de Forcalquier que viennent les quelques réponses positives, mais le séisme y a été très localisé, car les cantons de Banon, Forcalquier, La Brillanne, Noyers, Peyruis, Saint-Etienne, Sisteiron, Villeneuve, Volonne indiquent néant.

Dans le canton de Reillanne, Lincel signale une faible secousse, tandis qu'au chef-lieu rien n'est senti. Dans le canton de Manosque lui-même, Corbières, Pierrevet et Sainte-Tulle n'ont rien perçu. Au chef-lieu de canton de Manosque, M. Constantin, secrétaire de mairie, se trouvant en plein air au repos a senti la secousse, donnant l'impression de trois chocs presque simultanés et violents de haut en bas (IV). Aucun autre effet n'a été signalé. L'observation est confirmée par la commune de Volx (mairie).

Ainsi il s'agit ici d'un choc de degré IV environ, tout à fait localisé dans les environs de Manosque.

Il y a donc lieu de rapprocher ce séisme de celui du 8 décembre 1923 (voir Annuaire). Je rappelle que la petite ville de Manosque a été jadis le siège de séismes assez sévères.

E. ROTHÉ.

RÉGION DE L'OUEST

24 juin 1928 vers 0 h. 50 m. — On sait que les régions d'Angers et d'Anjou constituent un centre de légers foyers séismiques.

Sur la rive gauche de la Loire et dans une contrée déjà ébranlée plusieurs fois, notamment le 5 juillet 1923, (voir Annuaire de l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, 1923), une secousse a été nettement ressentie. Comme je l'ai indiqué d'autres fois, pour les séismes de ces régions, on trouve encore deux directions particulières de propagation : l'une W.-E., suivant la direction des failles armoricaines, l'autre S.W.-N.E., de Montrevault vers Angers.

MAINE-ET-LOIRE

ARRONDISSEMENT DE CHOLLET. — *Canton de Montrevault* : Chaudron-en-Mauges, 1 sec., soulèvement de bas en haut, chocs d'objets, vibrations, bruit de tonnerre (Landreau, vicaire). — La Salle et

Chapelle-Aubray, 1 sec., vibration de l'Ouest (Chauvigné, inst.). — *Le Puiset Doré*, 1 sec., ressentie par un petit nombre de personnes, balancement lent (le maire). — *La Boissière*, *Saint-Quentin-en-Mauges*, *Le Fuillet*, *La Chaussaire*, néant.

Canton de Beaupréau : *Beaupréau*, sec. N.E.-S.W., ressentie par toute la population, chocs de bouteilles, vaisselle jetée à terre, court grondement suivi d'une explosion. Cette secousse aurait été ressentie à Angers (A. Poilane, observateur météorologique). — *Gessé*, 1 sec., III, vibration horizontale (Vict^{esse} Jean de Béjarry). — *La Chapelle-du-Genêt*, 1 sec., N.E.-S.W., forte vibration des vitres, bruit de camion (Vallée, inst.). — *La Poitevinière*, 1 sec. de haut en bas, vibration de vaisselle, craquement de meubles, bruit souterrain (Veuve Usureau). — *Jallais*, sec. ressentie. — *Villedieu*, *La Jubaudière*, *Andrezé*, *Saint-Léger*, *Le May*, néant.

Canton de Saint-Florent-le-Vieil : *Saint-Florent*, 1 sec. ressentie par un assez grand nombre de personnes, vibration de vitres. — *Saint-Laurent de la Plaine*, 1 sec., III, N.-S., balancement lent, bruit de tonnerre, éveil de dormeurs (Chiron, inst.). — *La Chapelle Saint-Florent* : 1 sec., III, vibration de vaisselle, craquement de meubles, bruit de lourd camion (Perreau, inst.). — *Bourgneuf-en-Mauge*, 1 sec., IV, vibrations N.E. (Maugeant, inst.).

Canton de Chemillé : *Chemillé*, 1 sec., II, bruit de camion (Leroy). — *Saint-Lézin*, 1 sec., IV, craquement de meubles, de planchers (Sabarthez, inst.). — *Saint-Georges*, *Cossé*, *La Jumelière*, *Neuvy*, *Les Gardes*, *La Tourlandry*, néant.

Autres cantons : néant.

27 Décembre 1928 vers 21 heures. — Entre la vallée du Thoret et celle de La Dive, d'Airvault à Moncontour-de-Poitou, un séisme, d'intensité V a été senti le 27 décembre 1928, vers 21 heures du soir. La région où le phénomène a été le plus accentué, est de forme elliptique, le grand axe dirigé N.N.E.-S.S.W., étant perpendiculaire à la direction générale des plis hercyniens armoricains. C'est fort probablement sur la ligne de contact des granits et de jurassiques qu'a dû se produire l'ébranlement. Le mouvement s'est alors propagé vers le N.E., jusqu'aux formations plus récentes qui environnent Moncontour. On se trouve donc en présence d'un nouveau jeu de l'ancien détroit poitevin.

DEUX-SÈVRES

ARRONDISSEMENT DE PARTHENAY. — *Canton d'Airvault* : *Airvault*, 2 sec., à 1 s. d'intervalle, V, impression de soulèvement puis vibrations N.-S., bruit souterrain qui a pu être pris tout d'abord pour l'éclatement d'un bolide (Balquet, notaire et maire). — *Irais*, choc brusque et oscillations N.W., phénomène senti par presque toute la population (Cailleteau, inst.). — *Saint-Généroux*, 2 sec., à 1 m. d'intervalle, vibrations des vitres (Pantin, garde).

Canton de Saint-Loup : *Les Jumeaux*, 1 sec., 1 s., ressentie par tout le monde, S.W.-N.E., vibrations de carreaux, balancement de lampes.

Canton de Thénézay : *Aubigny*, fort roulement semblable au bruit produit par l'écroulement d'une maison (Girard).

Bressuire, *Azay-sur-Thouet*, *Melle*, *Niort*, néant.

VIENNE

ARRONDISSEMENT DE LOUDUN. — *Canton de Moncontour* : *Moncontour*, bruit souterrain assez fort, entendu par tous les habitants (Samoyault, inst.). — *Saint-Jean-de-Sauves*, 1 sec., observée dans plusieurs maisons, bruit souterrain (L. Requiem, maire). — *Ouzilly-Vignolle*, 1 sec., IV (M^{me} Ferrand). — *Loudun*, *Vouzon*, *Vouillé*, *Ayron*, *Mirebeau*, néant.

30 Décembre 1928 — Vers 21 h. 20. — Trois jours après la secousse précédente, un autre ébranlement a été ressenti dans la même région, mais un peu plus au N.W.

DEUX-SÈVRES

ARRONDISSEMENT DE BRESSUIRE. — *Argenton-l'Eglise*, 1 sec. assez forte, vibrations, bruit très fort (M^{me} Roulleau). — *Saint-Varent*, ch. l. c., 1 sec., vibrations, grondement (L. Hullin, maire). — *Bilazais*, canton de Thouars, 1 sec., ressentie par toutes les personnes non endormies, vibration de vaisselle (Poitton, maire). — *Marnes*, canton d'Airvault, choc brusque, puis roulement de 3 à 5 sec., vibration de vaisselle, de vitres, de planchers, ressentie par tous les habitants, même par les dormeurs, et aussi par les habitants du village de Lion, situé 4 kilom. plus à l'est (Blatteau P., inst.).

Tous les autres questionnaires nous sont retournés avec la mention : néant.

RÉGION DU NORD-OUEST

23 Décembre 1928. — 18 heures 15. — Des secousses séismiques ont été signalées dans les départements de la Manche et des Côtes-du-Nord. Les conclusions de notre enquête montrent qu'il ne s'agit que de très minimes ébranlements survenus à des heures différentes ; ils sont sans doute de faibles répliques de séismes bien plus importants dont l'épicentre a été indiqué sous la Manche (voir Annuaire de l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg, 1927, p. 84).

MANCHE

Une secousse ressentie par quelques personnes seulement est signalée à *Lessay*, arrondissement de Coutances. 13 autres bulletins nous sont retournés avec la mention néant.

CÔTES-DU-NORD

23 Décembre 1928. — 4 h. — Une secousse a été ressentie à *Quintenic*, canton de Lamballe (Gallery des Granges, maire). et à *Loudéac*, chef-lieu d'arrondissement (Boisadan).

23 Décem. 1928. — 22 h. — Une secousse est signalée à *Tréguier*, arrondissement de Lannion ; vibration de vaisselle, chute d'objets accrochés (Tondie, sous-lieutenant).

Tous les autres questionnaires nous sont retournés avec la mention : néant.

INDRE

27 Septembre 1928. — Une enquête faite sur quelques indications de la presse, dans le département de l'Indre, n'a donné que des résultats négatifs. Tous les bulletins nous sont retournés avec la mention : néant.

RÉGION DE L'EST

De faibles séismes ont eu lieu en Suisse le 23 août et le 5 décembre, non loin de la frontière française. Nos enquêtes faites dans les départements du Jura et du Doubs ont montré qu'ils n'ont pas été ressentis en France.

J. LACOSTE.

Tremblements de terre en Algérie

Pendant l'année 1928, soixante-neuf séismes ont affecté les trois départements algériens. Vingt-neuf de ces secousses ont été observées seulement et figurent dans le tableau ci-dessous. Vingt-quatre ont été à la fois enregistrées et observées, elles figurent au tableau I et elles ont été reportées dans la liste ci-dessous, accompagnées des renseignements microsismiques. Enfin seize séismes uniquement inscrits, ne figurent que dans le tableau I.

Deux séismes importants sont à relever. L'un a été ressenti dans la région de Staouéli le 2 juin vers 18 h. 39 m. A Staouéli deux secousses brusques ont été perçues, une maison a été lézardée (VIII), le mouvement a été ressenti à Douéra et à Sidi-Ferruch. Une formidable détonation a précédé la secousse (M^{me} Larue-Cassan). Le mouvement a même été perçu jusqu'à Alger, El Biar, Bouzaréah, III (Presse). L'autre séisme, dont l'épicentre se trouve dans les environs d'Inkermann, s'est produit le 24 août, vers 9 h. 44 m. A Inkermann, les plafonds ont été détachés, des murs lézardés, des vieilles maisons se sont effondrées ; deux enfants ont été tués par la chute d'un mur, deux indigènes sont morts sous les décombres de leur gourbi. A Saint-Aimé, une vaste construction neuve s'est effondrée (VIII-IX) ; à Relizane des murs ont été lézardés. Le séisme a été fortement ressenti dans un grand nombre de localités à l'intérieur de ce contour, Duperré, Boghari, Tiaret, Mascara, Mostaganem. De nombreuses sources seraient apparues dans la plaine sur la rive droite du Chélif. On parle de suintements pétrolifères. Cette secousse importante a été suivie de trois répliques ne causant aucun dégât.

Un tremblement dans la région de Constantine le 7 décembre aurait causé des dégâts, ce séisme n'a été signalé que par la presse et n'a pas donné d'inscription à l'Observatoire.

Le département de Constantine compte vingt-cinq tremblements de terre et a été le plus instable, dix-neuf secousses ont affecté le département d'Alger et neuf le département d'Oran.

Les renseignements macrosismiques sont en général fournis par le service météorologique d'Algérie ; quelques-uns viennent de la presse ou de correspondants particuliers.

Les lettres (O), (A), (C) indiquent les départements.

1928		h	m	s	
5 janvier	vers	21			(C) Edough W-E; Bugeaud, assez fort.
23 »	vers	19	50		(C) Souk-Ahras, E.-W.
17 mars	vers	12	10		(C) Condé-Smendou, 4 s., W.-E.
19 »	P	17	59	34	(A) Tizi-Ouzou.
29 »	P	19	18	04	(A) Beni-Sliman, 1 s., N.W.-S.E.
6 avril	eP	0	13	37	(A) Région Médéah-Boghar, Médéah, III (Presse) Brazza.
8 »	eP	22	26	52	(C) Région Bougie-Kerratra, W.-E., 3 s., assez violentes, Oued-Marsa S.-N., 3 s., vibrations des portes et fenêtres.
9 »	vers	18	05		(C) Kerratra, 1 à 2 s., S.W.-N.E., faible.
3 mai	vers	20	25		(A) Beni-Sliman, légère secousse.
9 »	vers	3	30		(C) Tizi-N'Béchar, N.-S., 1 s.
10 »	vers	13	20		(O) Sensible à Oran et dans la région (Presse) ; Mangin, assez violent.
10 »	vers	23	34	32	(C) El-Arrouch, W.-E.
22 »	vers	2			(O) Mascara, faible secousse.
22 »	vers	8			(O) Mascara, faible secousse.
26 »	vers	15	40		(O) Mascara, assez violent, 5 à 6 s.
27 »	vers	16	30		(O) Mascara, 3 à 4 s.
2 juin	iP	18	39	23	(A) Région Staouéli (VIII).
5 juillet	iP	3	39	39	(A) Région Cherchell, Orléansville, Rouina, assez violent, pas de dégâts ; Oued-Fodda, Duperré-Cherchell, S.W.-N.E., craquements de meubles.
5 »	vers	22			(A) Cherchell, faible (Presse).

(1) Les heures où figurent les secondes sont les heures d'arrivée de la phase P à l'observatoire d'Alger.

28 »	vers	13	15		(C) Oued-Marsa, N.-S.
28 »	vers	18			(C) Oued-Marsa, N.-S.
31 »	vers	7			(C) Tizi-N'Béchar, 2 sec., consécutives, 2 s., N.-S.
15 août	vers	22	30		(C) Bordy-Bou-Arréridj, N.W.-S.W., 2 s.
19 »	vers	4	0		(C) Tizi-N'Béchar, N.-S., 2 s.; Kerratra, faible.
22 »	vers	2	0		(C) Tizi-N'Béchar, 2 s.
24 »	iP	9	44	55	(O) Epicentre dans les environs d'Inkermann (VIII-IX).
24 »	e	10	28	48	(O) réplique (secousse signalée de Relizane).
24 »	e	12	18	40	(O) réplique.
24 »	e	22	02	43	(O) réplique.
29 »	eP	12	27	46	(A) Port-Gueydon, W.-E., 2 s., fort grondement ; population alarmée (Presse).
9 septembre P		22	30	15	(A) Région de Tizirt, secousse précédée de grondements arrivant de l'Est (Presse). Cap Bengut, Dellys, Haussonvilliers, Bordj-Ménaïel, Tizi-Ouzou, Fort-National.
9 »	vers	23	32		(A) Tizirt, réplique légère.
29 »	vers	22	15		(C) Kerratra, faible.
6 octobre eP		1	24	16	(A) Région de Ténès : Ténès, forte secousse, une cloche a tinté, émoi général, ni accidents, ni dégâts (Presse).
16 »	vers	9	35		(C) Mansoura, 1 s.
19 »	vers	18	20		(C) M'Sila, 3 secousses.
20 »	vers	2			(C) Tizi N'Béchar, N.E.-S.W., 1 s.
23 »	e	2	48	11	(C) Région de Constantine : Constantine, oscillations vives, population réveillée (Presse) ; Condé-Smendou, forte secousse suivie de grondements, S.-N., 8 s., El-Arrouch, assez forte, E.-W., 3 s., Philippeville, faible.
27 »	P	5	23	29	(A) Région d'Orléansville : Orléansville, secousse assez forte, N.W.-S.E., 3 s., Malakoff, Fromentin.
10 novembre vers		19	30		(C) Tizi N'Béchar.
15 »	eP	20	56	03	(A) Bouzaréah, III ; région Douéra ?
25 »	iP	1	7	15	(A) Région Castiglione, Tipaza, Castiglione, vibrations verticales assez violentes immédiatement précédées d'un grondement intense, claquements des tuiles, objets renversés ; Tipaza, fortes secousses ; Cherchell, El-Affroun, Souma, Alger, III, l'Arba, Roulna.
25 »	vers	1	30		(A) Castiglione, réplique faible accompagnée d'un fort grondement.
28 »	eP	17	1	48	(A) Castiglione, réplique, secousses verticales assez fortes.
3 décembre P		5	30		(C) Région Bône-Guelma : Guelma, forte secousse ; La Calle 3 oscillations, N.W.-S.E. ; Morris, N.W.-S.E., 5 à 6 s. ; Jemmapes, 4 sec., N.E.-S.W. ; Edough, assez fort, N.W.-S.E. ; El Arrouch, Herbillon, Bugeaud, Nelsonbourg.
5 »	vers	6	10		(C) Oued Marsa, vibrations des portes.
7 »	le matin				(C) Constantine, 4 maisons effondrées, quelques blessés (Martin).
16 »	iP	18	44	50	(C) M'Sila, Medjez.
16 »	iP	18	51	01	(C) Réplique du précédent.
21 »	vers	7	10		(C) Mansoura, faible.
24 »	iP	7	15	48	(A) Région Rouina, S.W.-N.E. ; Milianah, faible.
29 »	iP	10	37	37	(A) Région Tablat : Tablat, Ménerville, l'Arba, Alger.
29 »	P	11	58	04	(A) Tablat, réplique du précédent.

N.-B. — Un désastre à Djidjelli le 17 août a été signalé par la presse, mais une note de M. Gonnessiat, Directeur de l'Observatoire d'Alger-Bouzaréah, dans *La Nature*, signale que ce désastre est dû à une tornade, non à une secousse sismique.

Secousses séismiques au Maroc

Le 15 février, d'après la presse, des secousses séismiques ont été ressenties à Guersif dans le Maroc Oriental, entre 6 et 7 heures de matin. On compte quatre secousses d'environ 6 secondes chacune, qui ont ébranlé les maisons causant une panique particulièrement grande parmi les indigènes qui se sont sauvés dans la campagne. Le mouvement fut analogue au roulis. Des secousses semblables, ajoutée la presse, avaient eu lieu dans la même région en avril 1922, mais elles avaient été moins fortes.

M^{me} A. HÉE.

Tremblements de terre à Madagascar

Des bulletins rédigés par M. Ch. Poisson, s. j., directeur de l'Observatoire de Tananarive, nous avons extrait les renseignements qui suivent.

Au cours de l'année il a été enregistré 166 séismes (parmi lesquels 45 dont la distance n'est pas déterminable).

La répartition au cours des divers mois comporte 2 maxima, mars et novembre avec 17 séismes, et 2 minima, février avec 3 et août 4 séismes.

On a noté un nombre important de séismes correspondant à des distances inférieures à 500 km., assez peu de 500 à 1000. Il y en a un assez grand nombre (11) à une distance de 1200 à 1500 km. de Tananarive (foyer sous l'Océan Indien).

Voici le tableau général des résultats :

Distances :	0 à 500 km	500 à 1000	1000 à 5000	plus de 5000	Total
Janvier	2		3	1	6
Février	2		1		3
Mars	5		6	6	17
Avril	4		2	2	8
Mai	3	1	2	2	8
Juin	7	1		7	15
Juillet	12	1		2	15
Août	2		1	1	4
Septembre	8	1	1	3	13
Octobre	4		1	4	9
Novembre	6	3	4	4	17
Décembre	2			4	6
Totaux	57	7	21	36	121

4 secousses ont été ressenties :

29 janvier, degré II à l'Observatoire, avec bruit souterrain.

4 mai, degré II à l'Observatoire.

5 août, degré III à l'Observatoire (2 secousses). Ankidina, Ambohimasina IV, Arivonimamo III.

28 septembre, degré II-III à Tananarive.

C. Bois.

Tremblements de terre en Tunisie

Sousse : le 17 juillet 1928, à Sousse, à 21 heures 15 minutes, un bruit sourd a ébranlé la maison comme si un objet très lourd était tombé sur le parquet de l'étage supérieur. La secousse comportait un mouvement pouvant se décomposer en deux autres : le premier, de bas en haut et de haut en bas, le deuxième comme l'oscillation d'un fléau de balance.

Le phénomène a duré une seconde environ. Un violent orage a précédé et suivi le phénomène. (Signé : Anfre).

Segermes : le 17 décembre 1928 des secousses séismiques ont été ressenties à partir de 16 heures du matin.

Une première secousse légère suivie d'une plus accentuée qui a déplacé les tuiles des maisons. D'autres secousses ont été ressenties dans la matinée, certaines ont été assez violentes. (Signé : Ruggirolle).

V. LACROUX,
Chef du Service Météorologique Tunisien.

Renseignements transmis par le Ministère des Colonies

GUADELOUPE

Station météorologique du camp Jacob

12 septembre — Secousses séismiques accompagnées d'un cyclone.

22 septembre, à 4 h. 30 m. — Secousse séismique d'une durée de 3 s. 5.

Station de Pointe-à-Pître

23 septembre, à 5 h. 30 m. — 2 secousses Est-Ouest.

24 septembre, à 5 h. 30 — Secousse séismique d'une durée de 2 secondes.

4 octobre, à 4 h. 45 m. — Secousse séismique d'une durée d'environ 2 secondes.

GUINÉE FRANÇAISE

1928

Dans la nuit du 18 au 19 août, un séisme assez important a été ressenti dans le cercle de Forécariah ; l'épicentre peut en être situé à environ 12 kilomètres N.-N.E. de Forécariah, près du hameau de Ammaréa. Le terrain où le séisme s'est produit était avant l'événement une rizièrre faisant suite à une colline en pente douce.

Trois secousses très rapprochées ont été ressenties, accompagnées chacune d'un roulement semblable à celui d'un camion, puis on a vu des fumées sortir du sol en même temps que celui-ci se retournait par plaques. Une partie de la colline s'est effondrée, présentant une coupure de section cylindrique verticale.

La superficie bouleversée est de l'ordre de 20 hectares. L'aspect actuel du terrain peut être comparé à un champ retourné par un cultivateur géant avec une bêche à sa mesure. On ne voit qu'une ensemble de mottes de glaise latéritique ocre, sans trace d'humus, d'une hauteur de 2 à 4 mètres et d'un diamètre à la base de 4 à 10 mètres, laissant émerger les racines ou les branches d'une partie des arbustes qu'elles ont recouvertes.

MARTINIQUE

18 mai — Une secousse séismique a été ressentie à 10 h. 52 m. 30 s. à 50 km de la station de Fort-de-France.

COTE DES SOMALIS

Le 8 avril plusieurs secousses séismiques ont été ressenties à Djibouti vers 11 h. 42 m.

Mlle J. ROESS.

CORSE

7 février — Un tremblement a été ressenti en Corse le 7 février vers 23 h. L'aire pléistocéiste se compose de deux zones principales : Coti VI, Cauro VI et Sartène IV-V, Lévie V. Les zones d'intensité III et IV sont irrégulièrement distribuées autour. Les terrains affectés sont formés de roches éruptives anciennes : granites et gneiss. Les zones que nous venons d'indiquer sont parallèles à la direction des chaînes de montagne, direction qui est en outre celle de nombreux filons de granulite.

On peut noter que les séismes sont rares en Corse ; Montessus de Ballore n'en signale que 5.

ARRONDISSEMENT D'AJACCIO. — *Canton de Sainte-Marie-Siché : Cotichiavari*, 1 sec., 2 s., V-VI, réveil des dormeurs, choc brusque, les maisons ont balancé (plusieurs personnes). — *Sainte-Marie-Siché*, néant.

Canton de Bastelica : Cauro, 3 sec., à intervalle de 2 ou 3 s., VI, W.-N.E., fissures de plafonds, craquements de meubles, déplacement de tableaux (Peraldi, propriétaire).

Canton de Bocognano : Bocognano, 1 sec., balancement lent, IV (Morelli, maire).

Canton de Sari d'Orcino : Sari d'Orcino, 1 sec., vibration, IV (M^{me} Olivierri, intité). — *Calcatoggio*, 1 sec., vibration, IV (Ch. Chiappini, propriétaire).

Canton de Sarrola Carcopino : Sarrola Carcopino, 1 sec., vibration, III (Ange Marie Leca, débi-
tant).

Canton de Vico : Vico, 1 sec., vibration, IV (R. Quennesson et F. Fanucci, chauffeurs d'auto).

Canton d'Ajaccio : Ajaccio, Alata, néant.

ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE. — *Canton de Sartène : Sartène*, 2 sec., la première faible, suivie après 3 s. d'une deuxième plus forte, S.W.-N.E., mouvement de translation brusque, vibration de vais-
selle, déplacement du lit, bruit de détonation après la secousse, IV-V (C. Gatto). — *Sainte-
Lucie-di-Tallamo*, 1 sec., S.-N., de bas en haut, balancement brusque, III (Calvia, ingénieur du ser-
vice vicinal).

Canton de Lévie : Lévie, 1 sec., de bas en haut, balancement brusque, V (Ceretti, cantonnier).

Cantons de Serra di Scopamene, Bonifacio, Petreto et Bicchisano, Olmeto, Porto Vecchio,
néant.

ARRONDISSEMENT DE CORTE. — *Canton de Corte : Prunelli di Fiumorbe*, 1 sec., IV, craquement
de meubles et de planchers. — *Corte*, néant.

Cantons de Cartifao, Calacuccia, Sermano, Vezzani, Venaco, Ghizoni, Moita, néant.

ARRONDISSEMENT DE BASTIA. — *Cantons de Bastia, Luri, Cerrione, L'Isle Rousse, Belgodère, Olmi-
Capella, Lama, Oletta, Vescovata, Calenzana, Calvi*, néant.

C. Bois.

Macroséismes signalés 1928

DATE	LOCALITÉ	HEURE	MOUVEMENT			AUTORITÉ	ENREGISTRÉ A	OBSERVATIONS
			Intensité	Durée	Direction			
4 janv.	Limassol (Chypre)	dans la soirée	faible	assez longue		Agent consulaire à Limassol.		
5 —	Janina	2 ^h 47 ^m	IV-V	2 ^s	SE-NW	Agent consulaire à Janina.		La population a couché dehors. 5 secousses.
14 —	Provinces de Liège et du Luxembourg belge	0 ^h 17 ^m 54 ^s	VI-VII au maximum	1 à 7 ^s		Ambassadeur en Belgique	La plupart des observatoires européens.	Epicentre dans l'Eifel. A Tilleul : chute de blocs de schiste sur le quai de la gare. Verviers : murailles écroulées, personnes tombées des lits. Vielsalm : choc S.E.-N.W. En divers points, grondements souterrains. — Dans la région de Hoyet-Grupont, 2 ^e secousse entre 3 ^h et 4 ^h du matin.
8 févr.	Bandœng (Java)		assez violent			Consul général aux Indes néerlandaises.	Observatoires voisins.	Séisme en relation avec l'activité du volcan Krakatan.
12 —	Yokohama		VIII	16 m.		Consul à Yokohama	Observatoires japonais.	Epicentre : vallée du Kinu, 25 milles au N.-E. de Tokyo. Poteaux télégraphiques arrachés à Ibaragi. Chutes de tuiles et d'une cheminée à Utsunomiya. Ligne de chemin de fer coupée par un glissement de terrain.
22 —	Jérusalem	2 ^h 47 ^m du 3 ^e fuseau	IV	3 ^s		Consul général en Palestine.		
22 —	Jérusalem	19 ^h 48 ^m 30 ^s du 3 ^e fuseau	VII	3 ^s	SE-NW	"		Lézardes, effondrements de murs, faibles grondements.
22 —	Jaffa, Tel Aviv	8 ^h 02 ^m après-midi	IV	plus de 2 ^s	N-S	Consul à Jaffa.		A Tel Aviv mur effondré, bruit sourd, panique.
	Caïffa	environ 20 ^h	IV	2 ^s	de bas en haut	Consul à Caïffa.		Dégâts en de nombreuses localités de Palestine déjà éprouvées le 11 juillet 1927.
7 mars	Messine	11 ^h 56 ^m	V-VI	10 ^s	de bas en haut	Consul à Palerme.	Divers observatoires italiens.	1 secousse.
	Catane	11 ^h 56 ^m	IV-V	10 ^s	E-W et de bas en haut	"		1 secousse — Lézardes des murs et dégâts en diverses localités. Maisons détruites à Stromboli.
23 —	Yokohama	10 ^h 21 ^m 38 ^s	faible	11 m.		Consul à Yokohama	Observatoires japonais.	Epicentre 70 ^k NW de Tokyo. Objets renversés et brisés en certaines maisons.
26 —	Ljubljana (Yougo-Slavie)	15 ^h 40 ^m 49 ^s	faible			Chancelier du consulat à Ljubljana.	Un grand nombre d'observatoires.	Epicentre à 95 ^k de Ljubljana
	Inglav (Yougo-Slavie)	15 ^h 44 ^m	faible		W-E	"		Quelques dommages à Couazzo-Carnico.
	Trieste	15 ^h 30 ^m 30 ^s	II			Consul à Trieste.		
	Udine	15 ^h 30 ^m	IV			"		
27 —	Ljubljana	9 ^h 32 ^m 45 ^s	faible			Chancelier du consulat à Ljubljana.	Un grand nombre d'observatoires.	Epicentre à 130 ^k de Ljubljana
	Munich	9 ^h 32 ^m	IV	2 à 3 ^s		Légation en Bavière		1 secousse.
	Trieste	9 ^h 32 ^m 37 ^s	IV			Consul à Trieste.		Arrêt des pendules, ébranlement des meubles.
	Udine	9 ^h 33 ^m	V			"		A Talmezzo, 42 maisons écroulées, 8 morts, 24 blessés. Fortement ressenti à Verznigis, Cavallo, etc...
31 —	Smyrne	2 ^h 22 ^m	IX	30 ^s		Consul général à Smyrne.	Un grand nombre d'observatoires.	Epicentre : région Torbali (1660 maisons détruites, 10 tués, 68 blessés). Production de crevasses, eaux troublées. Dégâts matériels importants à Smyrne et en de nombreuses localités. — Répliques les 1, 2 avril, le 3 à 2 ^h et 5 ^h , le 9 à 20 ^h 15 ^m , le 10 à 3 ^h 05 ^m , le 11 à 16 ^h 30 ^m et à 17 ^h 30 ^m , le 15 à 21 ^h 18 ^m et 21 ^h 45 ^m .

DATE	LOCALITÉ	HEURE	MOUVEMENT			AUTORITÉ	ENREGISTRÉ A	OBSERVATIONS
			Intensité	Durée	Direction			
14 avril	Salonique	11 ^h 05 ^m (heure du f.)	V	10 ^s	E-W	Consul à Salonique	Nombreux obser- vatoires.	1 secousse — quelques lé- zardes.
16 —	Vera Cruz	21 ^h 26 ^m 19 ^s heure d'été de Mexico	VI-VII		NW-SE	Consul à Vera Cruz.	Nombreux obser- vatoires.	Epicentre 17°, 2' N 97°, 32' W. Les cloches ont tinté.
18 —	Salonique	21 ^h 26 ^m	V	10 ^s		Consul à Salonique	Nombreux obser- vatoires.	4 secousses — quelques dé- gâts çà et là en ville.
18 —	Andrinople	21 ^h 20 ^m	assez forte	10 à 12 ^s		Consul à Andrino- ple.		Gare de Papazoglou détruite, voie ferrée endommagée.
8 mai	Nouvelle Zélande	3 ^h 45 ^m	VIII		N-S	Consul à Auckland.	Observatoires voi- sins.	2 secousses principales, murs et routes crevassés, voies ferrées endommagées, etc.... Dégâts : plusieurs milliers de livres sterling. — Des répliques sont signa- lées.
14 —	Karsanti (Taurus)	20 ^h 33 ^m	faible	2 ^s	W-E	Consul à Adana.		Aucun dégât.
14 —	Bandjar Negara (Java).		vio- lent			Consul général aux Indes néerlandaises.		Suivi d'une éruption volca- nique désastreuse Répliques plus faibles à 2 ^h 32 ^m , 2 ^h 48 ^m , 4 ^h 23 ^m
15 —	Karsantis (Taurus)	0 ^h 05 ^s	faible	3 ^s	W-E	Consul à Adana.		Aucun dégât.
21 —	Yokohama	1 ^h 29 ^m	VIII	8 ^s		Consul à Yokohama.	Observatoires ja- ponais.	Chute de cheminées, murs ouverts, rupture de fils élec- triques, etc...
24 —	Kozan (Cilicie)	13 ^h	légère			Consul à Adana.		Epicentre à 60 ^{km} d'Adana.
12 juin	Karsanti	5 ^h 45 ^m	légère	9 ^s	N-S	"		Aucun dégât.
23 —	"	21 ^h 20 ^m	légère	5 ^s		"		Aucun dégât.
21 —	"	1 ^h 25 ^m	légère	12 ^s		"		"
21 —	"	19 ^h 20 ^m	violente	25 ^s	NW-SE	"		Maisons endommagées.
21 —	"	21 ^h	violente	10 ^s	NW-SE	"		Le 29 et le 30, 9 répliques lé- gères sans accidents ni dégâts.
14 juillet	"	21 ^h	légère			"		Pas de dégâts, grondements souterrains.
15 —	"	12 ^h 30 ^m	légère			"		"
1 août	Ilot Paloë (N de Florès)	dans la nuit	vio- lente			Consul général aux Indes néerlandaises.		Suivie d'un raz de marée désastreux et d'une éruption violente du volcan Rokatinda.
23 —	Adana	8 ^h 05 ^m		25 ^s	N-S	Consul à Adana.		Rochers précipités en bas des montagnes. Eaux troublées — 3 répliques de 9 ^h à 12 ^h , 1 à 16 ^h et 3 vers 22 ^h .
8 octob.	Mexico	21 ^h 02 ^m 05 ^s	VI	30 m.	N-S	Consul à Mexico.	Tous les observa- toires.	Dégâts importants à Vera Cruz, Oaxaca, Acapulco, Pue- bla, etc.
20 nov.	Antofagasta	16 ^h 30 ^m	vio- lent			Ministre au Chili.	Tous les observa- toires.	Dégâts à Antofagasta, Anica, Pampa-Union, etc...
3 déc.	Prahins (Suisse)	4 ^h 18 ^m	V-VI		E-W	Consul à Lausanne.	Observatoires voi- sins.	Tableaux déplacés, etc...
23 —	St-Sauveur, Jersey	17 ^h 55 ^m	III	5 ^s		Consul aux îles Anglo-Normandes.		1 secousse.
	St-Hélier, Jersey.	"	III	3 ^s	SV-NE	"		1 secousse — roulement. C. Bois.

Sur l'agitation microséismique à Strasbourg en 1928

Effet des anomalies sur les variations mensuelles et diurnes

par J. LACOSTE

L'agitation microséismique d'origine naturelle ou météorologique a eu, au cours des 9 dernières années (1920-1928) les valeurs mensuelles suivantes exprimées en microns :

Janvier	5,56	Juillet	1,04
Février	4,31	Août	1,42
Mars	3,47	Septembre	1,87
Avril	2,61	Octobre	2,57
Mai	1,46	Novembre	3,73
Juin	1,32	Décembre	4,32

Au cours de l'année 1928 ces valeurs mensuelles ont été

Janvier	6,83	Juillet	1,03
Février	5,69	Août	1,51
Mars	3,24	Septembre	1,61
Avril	2,58	Octobre	2,54
Mai	1,00	Novembre	4,29
Juin	1,57	Décembre	2,81

On peut remarquer qu'en 1928, les moyennes des mois de janvier, février, juin et novembre sont anormales par excès. Ces mois ont été exceptionnellement doux grâce à de nombreux noyaux de variations barométriques négatives qui ont parcouru les mers avoisinant les côtes françaises. J'ai déjà indiqué (Annuaire 1927, Séismologie, page 128) que le déplacement rapide de pareils noyaux sur des fonds marins exagérerait considérablement l'agitation microséismique ; leur fréquence variable peut donc modifier, d'année en année, les moyennes mensuelles. Pour cette raison, par exemple, le mouvement microséismique à Strasbourg atteignait 8 fois sa valeur normale le 8 et 9 juin et cette anomalie a eu évidemment sa répercussion sur la moyenne de ce mois.

Le maximum des perturbations ne s'enregistre pas aux mêmes heures dans les différentes stations. Grâce à l'obligeance de M. Whipple, j'ai pu faire les remarques suivantes, à propos de profondes perturbations qui, venues de l'ouest de l'Irlande, ont marché, par la mer du Nord, vers la Baltique, aux mois de novembre et de décembre.

Kew : maximum principal :	8,4	microns	le 24 novembre à 9 heures.
Strasbourg : id.	13,00	»	le 24 novembre à 18 heures.
Kew : maximum principal :	3,9	»	le 25 décembre à 8 heures.
Strasbourg : id.	4,3	»	le 25 décembre à 18 heures.
Kew : maximum principal :	4,1	»	le 30 décembre à 4 heures.
Strasbourg : id.	5,5	»	le 30 décembre à 8 heures.

L'intervalle de temps entre les heures des maximums dans les deux stations paraît tenir à la direction même des trajets que suivent les noyaux des variations. On constate aussi parfois qu'une forte baisse barométrique en marche au large des côtes de Bretagne a sa répercussion sur l'agitation microséismique à Strasbourg quelque temps avant Kew.

On comprend ainsi que les variations diurnes de l'agitation, si petites soient-elles, peuvent dépendre et des stations et des années.

MM. F. J. W. Whipple et F. J. Scrase ont calculé (1) pour 1926 et 1927, aux heures 0, 6, 12, 18, les excès ou les déficits de l'agitation microséismique sur la moyenne annuelle à Kew (composante N. S. Galitzine). Le même calcul pour Strasbourg montre des différences entre les deux stations.

(1) F. J. W. Whipple et F. J. Scrase Monthly notices, Geophysical, supplement, oct. 1928.

(2) J. Lacoste C. R. Ac. des Sc., T. 187. p. 447, 1928.

		0	6	12	18
Kex 1926	(microns)	+ 0,043	+ 0,022	— 0,070	— 0,002
Strasbourg	(ampl. moy. 1,774)	+ 0,011	+ 0,006	+ 0,005	— 0,020
Kew 1927	(microns)	+ 0,018	+ 0,022	— 0,032	— 0,009
Strasbourg	(ampl. moy. 2,293)	+ 0,012	— 0,030	+ 0,002	+ 0,015

Si l'on se rapporte simplement à une même station, (Strasbourg) et pour des années différentes, on trouve encore des dissemblances.

		0	6	12	18
Strasbourg	1925	— 0,027	— 0,021	+ 0,029	+ 0,019
	1926	+ 0,011	+ 0,006	+ 0,005	— 0,020
	1927	+ 0,012	— 0,030	+ 0,002	+ 0,015
	1928	+ 0,053	+ 0,010	— 0,072	+ 0,008

On comprend que ces excès ou ces déficits seraient variables si les mesures étaient faites à des heures différentes. J'ai indiqué (1), en effet, après avoir relevé l'agitation microsismique, heures, et les minimums vers 2 heures et 16 heures, le même fait s'étant reproduit chaque mois.

Sans doute les heures et les valeurs de ces maximums sont elles troublées parfois par les grandes perturbations passagères signalées précédemment et les variations diurnes de l'agitation microsismiques, excessivement faibles mais réelles, sont aussi difficiles à établir que celles des variations du champ électrique, du champ magnétique, des courants telluriques, etc. pour lesquelles des éliminations conventionnelles de perturbations anormales doivent être adoptées.

J. LACOSTE.

(1) J. Lacoste C. R. Ac. des Sc., T. 187. p. 447, 1928.

NOTICES NÉCROLOGIQUES

AUGUSTE LEBEUF (1839-1929)

L'Observatoire de Besançon est un des premiers qui ait inscrit en France d'une manière continue les phénomènes sismiques, grâce à la sollicitude de son Directeur, M. Auguste Lebeuf. Les collaborateurs du Bureau central se rappellent avec quel intérêt, lors de ses passages en Alsace, M. Lebeuf s'arrêtait devant les instruments et en discutait avec autorité le fonctionnement et les résultats. Bien que faiblement doté d'un poste de séismographes Mainka de 150 kg., l'Observatoire de Besançon, grâce au dévouement d'un personnel particulièrement compétent, apporte au Bureau une collaboration utile, dont cet annuaire est le témoin.

L'activité de M. Lebeuf, correspondant de l'Académie des Sciences depuis 1913, était particulièrement tournée vers l'astronomie proprement dite :

Ses premiers travaux se rapportaient à la Mécanique Céleste, à des polynômes rencontrés par Hansen et Tisserand. Il a créé des tables pour le calcul des perturbations de Jupiter sur les petites planètes.

Ce fut sa nomination, en 1903, à l'Observatoire de Besançon, qui l'engagea dans une voie nouvelle.

« On sait, dit M. E. Picard, qui fit son éloge funèbre à l'Académie, que cet observatoire, fondé par la ville de Besançon, le département du Doubs et l'Etat, a pour but spécial d'aider au développement de l'industrie horlogère de la Franche-Comté. Outre le service astronomique, il comprend un service chronométrique. Lebeuf a continué brillamment l'œuvre commencée par son prédécesseur Gruey, et il a rendu à l'horlogerie française des services de premier ordre.

Il fallait obtenir et conserver la confiance de la Fabrique bisontine et aussi donner aux épreuves chronométriques une valeur scientifique fixant l'attention de l'horloger désireux de perfectionner son art. Grâce à Lebeuf, notre région horlogère de l'Est peut aujourd'hui lutter avantageusement avec nos voisins. Peu à peu, notre règlement chronométrique a été élevé au niveau de ceux de Genève et de Neuchâtel ; en même temps, les déposants ont été encouragés, et le nombre des chronomètres présentés aux essais s'est élevé considérablement. Dans les concours avec la Suisse, l'Observatoire de Besançon a maintes fois obtenu les médailles d'or.

Tout en cultivant surtout la chronométrie, Lebeuf n'a cependant pas négligé la tâche dévolue à l'Observatoire de Besançon dans la Carte du Ciel, et il a fait suivre attentivement les Comètes et diverses petites planètes.

Lebeuf, mort le 13 juillet 1929, était le plus ancien Directeur d'Observatoire ; il venait d'être atteint par la limite d'âge. C'est avec la plus grande tristesse que le Bureau central voit disparaître un tel serviteur de la Science et du Pays.

CHARLES JACQUET (1893-1929)

L'Observatoire et l'Institut de Physique du Globe de Clermont ont été durement éprouvés par la mort de Charles Jacquet, décédé à la côte de Landais, le 23 août 1929. Docteur ès-sciences, Ingénieur des Mines, ce jeune savant, qui venait de soutenir sa thèse, remplissait depuis quelques années les fonctions de météorologiste à l'Observatoire du Puy-de-Dôme.

Bien qu'il ne fut pas chargé d'une manière spéciale du service de séismologie, il apportait à son beau-père, M. Mathias, une collaboration active et le Bureau central séismologique adresse, en cette circonstance douloureuse, au Directeur de l'Institut de Clermont l'expression de sa bien vive sympathie.

E. ROTHÉ.

Sur l'usage du variomètre magnétique
de Haalck et l'utilisation de procédés graphiques

*Résumé d'un mémoire présenté comme Diplôme d'Etudes supérieures de Sciences
physiques à la Faculté des Sciences de Strasbourg*


par J. P. ROTHÉ
Assistant à la Faculté des Sciences

Cet instrument dont la théorie et la description détaillée ont été exposées par son auteur (1) permet d'effectuer avec le même appareil et ses accessoires une mesure relative de la composante verticale Z du champ terrestre et de la composante horizontale H ; un théodolite additionnel permet d'obtenir la déclinaison, par rapport à des repères géodésiques. On sait que sa construction repose sur le principe de la balance magnétique. Je ne m'occuperai ici que des quelques points que j'ai été amené à préciser ou des méthodes graphiques que j'ai employées.

1° : Mesure de la composante verticale ΔZ .

On amène la balance successivement à l'équilibre à l'Est et à l'Ouest ; soit N_w et N_E les lectures correspondantes sur le cercle azimutal : la composante verticale est fonction de la différence $N_w - N_E$. Lorsque le champ a varié notablement de la précédente région d'études à la nouvelle, cette différence devient trop forte, et l'observateur est amené à employer un aimant compensateur P. (Fig. 1).


Fig. 1



Les constructeurs ne donnant aucune indication précise sur son emploi, j'ai cherché à me rendre compte de son influence sur les mesures et, en particulier, j'ai recherché la loi de variation

(1) Haalek : Zeitschrift für Geophysik (Jrg. 3, Heft 2/3, pp. 58-68) : Die neue Universalwaage — et : Zeitschrift für Instrumentenkunde (Jrg 47, 1927, Heft 1, pp. 12-32).

de la différence $N_W - N_E$ en fonction de son déplacement (1). En opérant, en une station déterminée, avec les divers aimants à ma disposition (2, 3, 4, 5), j'ai obtenu des courbes qui fournissent en quelque sorte l'étalonnage des différents aimants pour la recherche de ΔZ (en abscisses, les distances en millimètres de P, en ordonnées les différences azimutales $N_W - N_E$ en degrés (Fig. 2).



J'ai constaté que, à la station choisie pour l'étude, il était possible d'annuler $N_W - N_E$ avec les aimants forts (3, 4, 5), fournis en accessoires de l'appareil. Sans aimant, et pour le réglage existant au moment de la livraison et exécuté en Allemagne par les constructeurs, la différence $N_W - N_E$ prenait une valeur considérable : $25^{\circ}45'$. L'aimant 2 ne permettait pas de ramener cette différence à une valeur nulle. Ces courbes présentent l'avantage de permettre sans tâtonnements préliminaires le choix d'aimants convenables. C'est ainsi que la courbe 5 montre qu'un déplacement de l'aimant P de 10 divisions occasionne une variation de 3 degrés dans la valeur de $N_W - N_E$, ce qui correspond à environ 540 γ ($1 \gamma = 10^{-5}$ c. g. s.). L'équilibre étant obtenu à Strasbourg pour la division 370, si on se transporte en une région où, d'après les cartes établies par le Bureau central magnétique, pour la France par exemple, le champ aura varié de 500 γ environ, il faudra placer l'aimant à la division 380. Les courbes ont une autre utilité : elles assurent la comparaison de séries de mesures faites avec des aimants P placés à des distances différentes.

La méthode perd toute précision lorsque $\frac{N_W - N_E}{2}$ dépasse 2 degrés ; avec un aimant fort une faible variation de la distance influe beaucoup sur $N_W - N_E$ et l'azimut de l'aimant peut, d'autre part, être la cause d'erreurs graves ; la température enfin exerce sur cet aimant une influence dont il n'est pas tenu compte dans la théorie. Par suite, l'emploi de ces aimants compensateurs ne se justifie véritablement dans une région donnée, que dans le cas où les variations des différences $N_W - N_E$ deviennent assez importantes pour que les causes d'erreurs énumérées ci-dessus puissent être négligées ; encore faut-il employer un aimant aussi peu intense que possible, avec lequel les chances de dérèglement sont atténuées. Les mesures que j'ai effectuées dans la plaine

(1) La théorie montre que l'écart angulaire doit rester faible si on veut appliquer les opérations différentielles fondamentales.

d'Alsace ont mis en évidence l'inutilité de son emploi pour cette région et même les avantages que présente sa suppression.

La précision des mesures se fait avec une erreur maximum d'environ 4 minutes sur N_W-N_E , il en résulte sur ΔZ une approximation d'une vingtaine de γ . On voit ainsi qu'il ne faut pas espérer mettre en évidence d'une manière indiscutable, des variations inférieures à cet ordre de grandeur. A cette imprécision expérimentale s'ajoute celle qui est due à la variation diurne de l'élément magnétique envisagé qui atteint fréquemment et peut dépasser pour Z vingt γ . Pour s'affranchir de cette importante cause d'erreur on admet que cette variation diurne est la même aux mêmes heures pour une région très étendue. Aussi se contente-t-on d'utiliser en Alsace les courbes de variation inscrites à la station magnétique du Val Joyeux, près de Paris. Il serait évidemment préférable d'employer sur place un variomètre inscripteur ou d'opérer avec deux équipes d'observateurs munies de deux appareils pointant au même moment dans les deux stations dont on veut évaluer la différence. Il faut naturellement éliminer les mesures faites par des jours de forte agitation magnétique. Les variations de température jouent encore un rôle important et les coefficients de correction à employer sont souvent incertains et variables. Ces diverses causes d'erreurs négligeables dans le cas de variations importantes, entraînent de grosses difficultés dans des régions où les perturbations à rechercher sont faibles. Les mesures exécutées en 1928 dans le bassin potassique du Haut-Rhin ont fait apparaître dans des cas rares des domaines de variation d'une centaine de γ mais bien souvent moins grands, 40 γ par exemple. On n'est plus loin alors de la limite des perturbations que tout au moins l'appareil employé peut nettement mettre en évidence. Pour des valeurs inférieures, les résultats ne sont plus qu'approximatifs, des indications de probabilités.

2° : Mesure de la composante horizontale ΔH .

On amène l'instrument à l'équilibre dans le plan du méridien magnétique en utilisant un aimant auxiliaire K (fig. 1) ; la formule suivante fournit la valeur de ΔH :

$$\Delta H = \frac{1}{2} [k_3 (n_s - n_n) - k_2 (n_n - n_o)] + \frac{\mu_1 - \mu_2}{2} (t - t_0) \quad I$$

où k_3 et k_2 sont des coefficients constants, μ_1 et μ_2 les coefficients de température.


D'après la notice des constructeurs, l'observateur se contente de repérer la position de l'équipage mobile en lisant les valeurs n_n et n_s , par autocollimation sur une échelle, pour une seule distance de l'aimant K, qui doit être maintenue pour toute la prospection. Or il peut arriver que l'équipage dévie trop et que l'image sorte du champ lorsque les conditions magnétiques changent notablement d'une station à l'autre. Aussi est-il préférable de substituer à une lecture unique une série de lectures faites pour des distances variables de l'aimant K.

Exemple :

Distances de l'aimant K

	309	310	311	312
n_N	7,5	3	-1,5	-5,5
n_S	3	11	13	25

Fig. 3



Cette série de lectures peut se représenter graphiquement (fig. 3), en portant en abscisses les distances de l'aimant K et en ordonnées les lectures sur l'échelle. Les points ainsi obtenus pour n_n et n_s s'alignent suivant des courbes : le calcul montre qu'elles ont une forme hyperbolique mais sont telles qu'on peut, sans erreur notable, les assimiler à des droites. Si au lieu de porter directement en ordonnées les lectures n_n et n_s , on les multiplie au préalable par les constantes $\frac{1}{2} k_2$ et $\frac{1}{2} k_3$, on obtient deux nouvelles droites, à peu près également inclinées sur les axes. Il est aisé de voir, d'après la formule I, que le graphique fournit alors directement la valeur de ΔH ; l'application des formules théoriques conduit aussi à la lecture directe de ΔZ . J'ai opéré en construisant ainsi si pour chaque station un graphique où chaque point figure à température constante : les droites ainsi tracées sont d'ailleurs sensiblement parallèles de station en station. Je choisis alors une station que j'appellerai *station de base* et je calcule ensuite pour chaque station suivante, et pour les différentes distances de l'aimant K les moyennes des écarts aux valeurs correspondantes pour cette station de base. La variation de la composante horizontale ΔH , par rapport à la station de base sera alors :

$$\frac{1}{2} \left(k_3 \times \text{moy. écarts } n_s - k_2 \times \text{moy. écarts } n_n \right)$$

Cette méthode a l'avantage de permettre le contrôle des différentes mesures, d'éliminer les mauvaises lectures et surtout de raccorder entre elles les différentes stations d'un profil, ce qui serait très incommode, sinon impossible, avec la méthode de lecture unique, surtout quand, par suite de grandes variations, l'échelle mobile sort du champ de la lunette pour la division choisie et qu'une extrapolation devient nécessaire. Exemple (Détermination de n_n) :

Stations	Divisions de l'échelle de K (mm)				
		309	310	311	312
I		9,5	4,8	0	-4,8
II		7,5	3	-1,5	-6
III		7	2,5	-2	-6
IV		10	5	0	-4,5
V		11,5	7	2,5	-2
VI		6	2	-2	-6

Je forme dans chaque colonne les différences des lectures des différentes stations et de I.

	309	310	311	312	312 corrigé
I	0	0	0	0	0
II	-2	-1,8	-1,5	-1,2	-2
III	-2,5	-2,3	-2	-1,2	-2
IV	+0,5	+0,2	-0	+0,3	-0,5
V	+2	+2,2	+2,5	+2,8	+2
VI	-3,5	-2,8	-2	-1,2	-2

On voit que les nombres de la colonne 312 sont un peu plus grands que les correspondants des autres colonnes : cela provient d'une lecture défectueuse pour la station I, division 312. En effet, si nous changeons -4,8 en -4, les différences de la dernière colonne cadrent mieux avec les autres. Au contraire, si, comme cela se présente pour la station VI, division 309, la différence est plus forte que celles des divisions voisines, il y a lieu d'admettre que la lecture correspondante a été défectueuse. On peut ainsi s'affranchir d'erreurs expérimentales à peu près inévitables avec des équipements magnétiques mobiles sur couteaux.

Exemple de l'application de la méthode

J'ai utilisé l'appareil magnétique de Haalck en diverses régions d'Alsace, dans le bassin potassique du Haut-Rhin d'une part, ou au contraire au Nord, dans la recherche d'accidents du tertiaire au voisinage de la zone pétrolifère de Pechelbronn. Voici un exemple des observations faites et conclusions tirées.

Dans la région d'Ensisheim (bassin potassique), deux sondages distants de 800 mètres avaient révélé aux mineurs et aux géologues l'existence d'un accident important : en effet, s'ils avaient d'abord traversé tous les deux un épais manteau d'alluvions (80 mètres environ), le premier, situé à l'ouest avait rencontré la première couche de sel à 407 mètres de profondeur tandis que le second plus à l'est était encore à 736 mètres dans du grès calcaire micacé à plantes appartenant à la partie supérieure des couches à Meletta. Le sel subit donc entre ces deux sondages une dénivellation dépassant 450 mètres.

Le problème posé était donc le suivant : mettre, si possible, la faille en évidence et déterminer sa direction. Un premier profil reliant les emplacements des deux sondages a montré nettement l'existence d'un accident tectonique qui se manifeste par une variation de 110 γ pour ΔZ . Des profils successifs, s'étendant vers le nord et vers le sud, ont encore manifesté une anomalie en fournissant pour ΔZ des variations maximums de 100 γ ; les variations de ΔH sont plus faibles, au voisinage de 60 γ ; Or, les régions où apparaissent les anomalies se rangent sur une droite orientée SSW-NNE, qui vraisemblablement est la direction même de cet accident. C'est précisément celle des grandes fractures rhénanes et c'est aussi celle de l'axe du dôme de sel de Meienheim qui a été reconnu à quelques kilomètres au Nord (1). Il n'est pas impossible que, dans le nord de la région que j'ai étudiée, — et certains profils justifient cette supposition — d'une part en vertu de la grande profondeur, du côté abaissé, des sédiments intéressés (c'est « la zone du bas-fond » de Monsieur Friedel), d'autre part, grâce à la fracture elle-même, un dôme se soit également formé, que les mesures magnétiques auraient ainsi mis en évidence. Cet exemple montre l'intérêt de la méthode, à condition de ne l'utiliser dans des régions de champ aussi peu variable qu'avec les précautions, les améliorations diverses indiquées ci-dessus.

J.-P. ROTHÉ.

(1) G. Friedel : C. R. A. S. 1927, Tome 184, p. 1028. Sur l'existence d'un dôme de sel dans le bassin potassique oligocène du Haut-Rhin.

ANNEXE II

Recherches sur les fils d'élinvar (1)

par Boris PÉRÉBASKINE

Au cours de l'année 1928, M. Rothé m'a engagé à exécuter sous sa direction des recherches sur la torsion des fils et plus particulièrement sur l'influence de la température. On connaît l'importance actuelle des opérations gravimétriques pour la résolution des problèmes d'ordre pratique. Un des graves inconvénients de la balance d'Eötvös consiste dans la variation d'élasticité du platine irradié avec la température. Le Directeur de l'Institut a récemment fait adapter au séismographe de Galitzine un ressort en élinvar qui évite très heureusement les dérèglages trop fréquents de cet inscripteur. C'est la même idée qui a présidé au travail actuel. Sans doute, il est fâcheux d'utiliser un fil d'une substance ferromagnétique : il a semblé à l'usage que cet inconvénient était faible par rapport aux avantages réalisés.

Pendant plus de quarante jours deux fils ont été en observation, le premier de 0^{mm},08 de section et de 66^{cm} de longueur, l'autre de 0^{mm},08 de section et de longueur l = 20^{cm}. Malgré des variations, hausses et baisses de température de l'ordre de 7° C., l'équilibre n'a jamais varié que dans un seul sens par suite d'une détorsion qui pourrait d'ailleurs être évitée comme on évite celle du platine par une fabrication soignée et un enroulement spécial. Pendant le même temps un fil de platine irradié, de mêmes dimensions, faisait sortir le spot lumineux du champ. Il arriva que la température subit des variations brusques de 5° C. en deux heures et demie. L'équilibre demeura le même pour l'élinvar, tandis que l'équipage suspendu au platine se déplaçait largement.

Voici quelques résultats relatifs à un fil chauffé à l'étuve pendant quatre jours aux températures finales 56° à 57°. Le coefficient d'élasticité est égal à 4,54.

Les nombres du tableau suivant relatifs au fil de 0^{mm},08 l = 66^{cm}, montrent manifestement la détorsion avec le temps, mais indiquent que la température influe peu, même pendant cette période, sur la durée d'oscillation dont la valeur moyenne la plus fréquente est voisine de 8m.35s.

Jours	Température	Lecture moyenne à l'azimut 180°	Période d'oscillation	Jours	Température	Lecture moyenne à l'azimut 180°	Période d'oscillation
Avril				Avril			
2	9,6	12,080	8 m. 47 s.	17	12	14,467	8 m. 22 s.
3	9,2	11,999	8 m. 32 s.	18	11,3	11,304	8 m. 16 s., 5
4	10,0	11,978	8 m. 32 s.	19	10,5	12,233	8 m. 35 s.
5	11,0	12,073	8 m. 31 s.	20	9,5	12,285	8 m. 36 s.
6	12,0	11,913	8 m. 16 s.	21	10,4	12,218	8 m. 35 s., 5
7	12,5	12,042	8 m. 32 s., 5	22	11,2	12,190	8 m. 33 s.
8	13,5	11,882	8 m. 36 s.	23	10,4	12,295	8 m. 32 s.
9	15	11,745	8 m. 18 s., 5	24	11,8	12,216	8 m. 30 s.
10	16	11,756	8 m. 18 s.	25	14,6	12,158	8 m. 37 s., 5
10	17,5	11,739	8 m. 40 s.	28	19,3	11,654	8 m. 16 s.
11	17,5	11,682	8 m. 13 s., 5	mai			
12	16	11,523	8 m. 28 s.	1	16,3	12,289	8 m. 32 s.
13	14,2	11,486	8 m. 36 s.	2	16,4	12,265	8 m. 40 s.
14	13,8	11,630	8 m. 24 s.	4	19,4	12,167	8 m. 35 s.
16	14,4	11,403	8 m. 36 s.	6	20,8	12,315	8 m. 36 s.

De ces observations il résulte qu'au cours d'une série de mesures avec la balance d'Eötvös la variation de température est très atténuée pour les fils d'élinvar de cette coulée. Il semble d'ailleurs que la variation est notablement différente suivant la nature de l'élinvar, c'est à dire la constitution de l'alliage coulé et trifilé.

B. PÉRÉBASKINE.

(1) Résumé extrait d'un travail présenté à la Faculté des Sciences de Strasbourg comme diplôme d'ingénieur-géophysicien (mention technicien) le 12 juillet 1928.

